

Comité d'homologation départemental

par Alain FOSSÉ

Introduction

À la fin de 1994, il nous a paru nécessaire de créer un comité d'homologation départemental. Son rôle est de porter un regard critique sur les observations inhabituelles qui arrivent dans le fichier. Ce comité — certes un peu policier — doit donc être le garant d'une certaine rigueur dans la collecte des informations sur l'avifaune départementale.

Le comité est composé de Jean-Claude BEAUDOIN, Francis CAUET, Alain FOSSÉ, Alain GENTRIC, Victor LERAY, Olivier LOIR, Gilles MOURGAUD, Thierry PRINTEMPS et Thierry ROGER.

L'homologation des observations inhabituelles prend effet à dater du 1^{er} janvier 1995.

Recommandations pour la transmission d'une observation inhabituelle

Qu'est-ce qu'une observation inhabituelle ?

Une observation peut être inhabituelle parce que :

- *l'espèce* est inhabituelle (en Maine-et-Loire et/ou en France). Les comités d'homologation départemental (CHD) et national (CHN) établissent donc une liste de ces espèces selon des critères de rareté et/ou de difficultés d'identification.

Ainsi, vous trouverez ci-joint deux listes d'espèces soumises à homologation : une pour le Maine-et-Loire et une pour la France.

Ces deux listes sont complémentaires : les données d'espèces rares à l'échelle nationale sont transmises au CHN et celles d'espèces rares à l'échelle départementale sont examinées par le CHD.

Ces listes sont, bien sûr, susceptibles d'être modifiées dans les années à venir.

Il est souhaité que les données destinées au CHN soient communiquées aussi au CHD pour information (copie ou original que le CHD transmettra).

- *la date de l'observation* est inhabituelle (il s'agit bien sûr d'espèces non sédentaires en Maine-et-Loire).

La phénologie de ces espèces — c'est-à-dire leur(s) période(s) de présence —, que ces espèces soient de passage, estivantes (nicheuses ou non) ou bien hivernantes, est assez bien connue.

Le CHD souhaite que les observateurs qui recueillent une donnée en dehors des périodes classiques en fassent part en remplissant une fiche comme s'il s'agissait d'une espèce rare (par exemple, un Faucon émerillon le 12 juin, un Petit Gravelot le 3 janvier...).

Vous trouverez donc ci-joint une liste des espèces non sédentaires avec leur(s) période(s) habituelle(s) de présence en Maine-et-Loire (les fourchettes devraient être assez larges pour ne pas être trop contraignantes).

La fiche

Elle comporte deux pages : le recto précise les circonstances de l'observation et le verso les caractéristiques de l'oiseau. La description doit faire apparaître les critères qui ont permis l'identification de l'espèce (critères diagnostiques encadrés). Tous les autres détails sont bien sûr également souhaités. Des dessins, même maladroits, ainsi que des photos, sont toujours utiles. *Ne décrivez que ce que vous avez observé ! Ne recopiez pas la description d'un guide !...*

Essayez d'utiliser des termes précis pour décrire les différentes parties du plumage (le *ventre* n'est pas les *flancs*, le *menton* n'est pas la *gorge*, le *manteau* n'est pas le *dos*...); la plupart des guides présente la topographie précise de l'oiseau.

Seule une description suffisamment précise permettra au Comité de trancher : il va de soi que la validation (ou l'invalidation) de l'observation fournie ne sanctionne pas l'observation elle-même mais seulement la description qui en est faite.

Ayez donc le réflexe, lorsque vous observez une espèce que vous n'avez pas l'habitude de voir :

① **de prendre sur place une description précise : décrivez un maximum d'éléments (plumage, bec, pattes, œil...), comparez la taille à une espèce connue, présente ou non, notez le comportement, les cris ou chants... et si possible, regardez votre guide APRÈS l'oiseau (combien d'oiseaux ont ainsi disparu pendant que l'on avait le nez dans le livre...);**

② **de vérifier si elle ne fait pas partie d'une des trois listes pour remplir au besoin une fiche.** □

Liste des espèces soumises à homologation en Maine-et-Loire

Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	**Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	*Pingouin torda	<i>Alca torda</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	*Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>
*Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
*Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	*Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
*Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	*Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
*Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
*Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
*Puffin de Méditerranée	<i>Puffinus yelkouan</i>	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
*Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	*Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	**Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
*Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	*Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	*Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Héron gardeboeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	*Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	*Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	*Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	*Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	Locustelle lusciniotide	<i>Locustella luscinioides</i>
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	*Lusciniote à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
*Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
*Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
*Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	*Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>
*Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	**Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	**Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	**Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	*Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	*Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
*Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	*Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>	*Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>	*Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	*Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
		et Bernache cravant à ventre pâle	<i>branta bernicla hrota</i>
		Bergeronnette printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
		Pouillot véloce nordique	<i>Phylloscopus collybita tristis/abietinus</i>
		Pie-grièche (grise) méridionale	<i>Lanius (excubitor) meridionalis</i>
		Corneille mantelée	<i>Corvus corone cornix</i>

et exotiques non pris en charge par CHN (Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*, Oulette d'Égypte *Alopothen aegyptiacus*...)

Légende

1 : contact visuel, 2 : hors Saumurois, 3 : hors Fontevraud, * : aucun contact en M.-et-L., ** : contact(s) antérieur(s) à 1960

Présence des espèces non sédentaires en Maine-et-Loire

	du	au	+	du	au		du	au	+	du	au
Plongeon catmarin	30.10	15.4				Guifette noire	7.4	26.10			
Grèbe à cou noir	15.7	15.5				Tourterelle des bois	5.4	5.11			
Blongios nain	20.4	22.9				Coucou gris	1.3	30.9			
Bihoreau gris	10.3	15.11				Engoulevent d'Europe	15.4	30.9			
Grande Aigrette	14.10	31.3				Martinet noir	6.4	15.9			
Héron pourpré	20.3	30.9				Huppe fasciée	5.3	30.9			
Cigogne noire	1.3	15.10				Torcol fourmilier	1.4	30.9			
Spatule blanche	4.3	15.6	+	15.7	17.11	Hirondelle de rivage	5.3	25.10			
Bernache cravant	1.10	31.3				Hirondelle de cheminée	6.3	5.11			
Canard siffleur	25.8	27.4				Hirondelle de fenêtre	10.3	7.11			
Sarcelle d'été	20.2	15.10				Pipit rousseline	15.4	30.9			
Bondrée apivore	20.4	7.10				Pipit des arbres	20.3	15.10			
Milan noir	25.2	15.9				Pipit spioncelle	25.9	16.4			
Circaète Jean-le-Blanc	20.3	(15.9)				Bergeronnette printanière	20.3	31.10			
Busard cendré	1.4	20.9				Bergeronnette flavéole	25.3	25.9			
Faucon émerillon	1.10	30.4				Bergeronnette de Yarrell	20.9	10.4			
Faucon hobereau	1.4	31.10				Rossignol philomèle	1.4	8.9			
Faucon pèlerin	1.9	30.4				Rougequeue à front blanc	15.3	20.10			
Caille des blés	24.4	(15.9)				Tarier des prés	15.3	15.10			
Râle des genêts	1.4	(30.9)				Traquet motteux	5.3	15.11			
(Marouette ponctuée)	8.3	20.9)				Merle à plastron	20.3	2.5			
Outarde canepetière	1.4	(25.10)				Grive litorne	5.10	30.4			
Petit Gravelot	10.3	10.11				Grive mauvis	1.10	15.4			
Grand Gravelot	20.2	10.11				Locustelle tachetée	25.3	15.8			
Pluvier doré	15.7	20.5				Phragmite des joncs	1.4	20.9			
Bécasseau maubèche	20.3	20.6	+	20.7	20.10	Rousserolle effarvatte	14.4	1.10			
Bécasseau sanderling	20.4	10.6	+	20.7	30.11	Hypolaïs polyglotte	20.4	14.9			
Bécasseau minute	1.7	30.12	+	1.3	20.6	Fauvette grisette	28.3	25.9			
Bécasseau cocorli	1.5	20.10				Fauvette des jardins	25.3	16.9			
Bécasseau variable	20.2	10.1				Pouillot de Bonelli	25.3	25.8			
Bécassine sourde	20.9	10.5				Pouillot siffleur	10.4	16.9			
Barge rousse	20.3	20.5	+	10.7	30.10	Pouillot fitis	10.3	10.10			
Barge à queue noire	15.1	30.10				Gobemouche gris	8.4	10.10			
Courlis corlieu	20.3	20.9				Gobemouche noir	15.4	20.5	+	12.8	6.10
Chevalier arlequin	20.2	10.12				Tichodrome échelette	15.10	31.3			
Chevalier aboyeur	20.3	10.12				Loriot d'Europe	15.4	5.9			
Chevalier sylvain	10.3	20.10				Pie-grièche écorcheur	15.4	31.8			
Tournepieuvre à collier	20.3	20.6	+	10.7	10.10	(Pie-grièche grise	1.10	31.Mar)			
Sterne pierregarin	7.3	24.10				(Pie-grièche à tête rousse	24.4	10.Aoû)			
Sterne naine	10.4	4.10				Pinson du Nord	10.10	10.4			
Guifette moustac	5.4	30.6				Tarin des aulnes	3.10	15.4			

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.

Liste des espèces soumises à homologation en France

Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	
Albatros hurleur	<i>Diomedea exulans</i>	
Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	
Puffin semblable	<i>Puffinus assimilis</i>	
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	
Océanite de Castro	<i>Oceanodroma castro</i>	
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	
Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	
Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i>	
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	
Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i>	
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	
Érismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	
Érismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	
Aigle des steppes	<i>Aquila rapax</i>	
Aigle impérial	<i>Aquila heliaca</i>	
Aigle ibérique	<i>Aquila adalberti</i>	
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonorae</i>	
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>	
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>	
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>	
Talève d'Allen	<i>Porphyrio alleni</i>	
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	
Foulque caronculée	<i>Fulica cristata</i>	
Outarde houbara	<i>Chlamydotis undulata</i>	
Grande Outarde	<i>Otis tarda</i>	
Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i>	
Glaréole à ailes noires	<i>Glareola nordmanni</i>	
Gravelot de Leschenault	<i>Charadrius leschenaultii</i>	
Pluvier asiatique	<i>Charadrius asiaticus</i>	
Vanneau sociable	<i>Chettusia gregaria</i>	
Vanneau à queue blanche	<i>Chettusia leucura</i>	
Bécasseau à queue pointue	<i>Calidris acuminata</i>	
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>	
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	
Courlis à bec grêle	<i>Numenius tenuirostris</i>	
Bargette du Térek	<i>Xenus cinereus</i>	
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>	1
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouini</i>	2
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>	
Mouette de Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>	
Mouette ivoire	<i>Pagophila eburnea</i>	
Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>	
Sterne élégante	<i>Sterna elegans</i>	
Sterne bridée	<i>Sterna anaethetus</i>	
Sterne fuligineuse	<i>Sterna fuscata</i>	
Guillemot de Brünnich	<i>Uria lomvia</i>	
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>	
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	3
Syrhapte paradoxal	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>	
Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>	
Engoulevent à collier roux	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	
Guêpier de Perse	<i>Merops superciliosus</i>	
Sirlin de Dupont	<i>Chersophilus duponti</i>	
Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	
Pipit de la Petchora	<i>Anthus gustavi</i>	
Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>	
Agrobate roux	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
Rossignol progné	<i>Luscinia luscinia</i>	
Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellinus</i>	
Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	
Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	4
Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	
Grive de Sibérie	<i>Zoothera sibirica</i>	
Grive obscure	<i>Turdus obscurus</i>	
Grive de Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	
Grive à gorge noire/rousse	<i>Turdus ruficollis</i>	
Locustelle de Pallas	<i>Locustella certhiola</i>	
Locustelle lancéolée	<i>Locustella lanceolata</i>	
Locustelle fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i>	
Locustelle fasciée	<i>Locustella fasciolata</i>	
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>	
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	
Hypolaïs pâle	<i>Hippolais pallida</i>	
Hypolaïs bottée	<i>Hippolais caligata</i>	
Fauvette sarde	<i>Sylvia sarda</i>	2
Fauvette de Rüppell	<i>Sylvia rueppellii</i>	
Fauvette naine	<i>Sylvia nana</i>	
Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	
Pouillot verdâtre	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	
Pouillot boréal	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	
Pouillot de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	
Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>	
Pie-grièche masquée	<i>Lanius nubicus</i>	
Étourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	2
Étourneau roselin	<i>Sturnus roseus</i>	
Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	
Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>	
Durbec des pins	<i>Pinicola enucleator</i>	
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephala</i>	
Bruant cendrillard	<i>Emberiza caesia</i>	
Bruant rustique	<i>Emberiza rustica</i>	
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	
Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	

plus toutes les espèces nord-américaines, toutes les espèces plus rares que celles mentionnées ci-dessus, tous les genres n'appartenant pas à la faune nicheuse européenne, certaines sous-espèces (Bernache cravant du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, Sarcelle d'hiver américaine *Anas crecca carolinensis*, Bergeronnette printanière *Motacilla flava feldegg...*), espèces occasionnelles dont l'origine est sujette à caution (Oie des neiges *Anser caerulescens...*).

Légende

1 : en dehors du littoral méditerranéen, 2 : sauf Corse, 3 : pour les oiseaux échoués, indiquer seulement nombre, lieu et date, 4 : sauf Albères

FICHE DESCRIPTIVE D'UNE OBSERVATION INHABITUELLE

ESPÈCE PROPOSÉE :

Nombre d'individus : Sexe : ...♂ ...♀ Âge : ...ad. ...juv. ...imm.

LOCALITÉ :

Lieu-dit : Commune :

Département :

DATE DE L'OBSERVATION :

Durée de l'observation :

Autres dates d'observation du même oiseau :

NOM DU RÉDACTEUR DE LA FICHE :

Adresse :

.....

.....

Téléphone :

AUTRES OBSERVATEURS :

.....

Oiseau trouvé par : Identifié par :

L'oiseau a-t-il été capturé ? Quand ?

conservé ? Où ?

photographié ? Par qui ?

Matériel optique utilisé :

Distance d'observation :

Conditions d'éclairage :

Milieu dans lequel l'oiseau a été observé :

.....

Connaissance antérieure de l'espèce : OUI NON

Connaissance d'espèces voisines :

.....

Circonstances de l'observation :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Fiche à retourner au Comité d'homologation départemental
chez Alain Fossé, 63 bis, rue Barra, 49100 ANGERS.**

page 1

