

Recensement des Laridés en Maine-et-Loire en décembre 1996

Gilles MOURGAUD

1. Méthode

À l'initiative du Groupe ornithologique normand (GONm) et de la revue *Ornithos*, un recensement national des Laridés hivernants a été organisé au cours de l'hiver 1996-1997. Il s'agissait donc, douze années après le premier recensement national (SAGOT 1985), de faire un point sur ces oiseaux d'eau dont les effectifs hivernants en France étaient finalement très mal connus (CRÉAU & DUBOIS 1997).

En Maine-et-Loire, les décomptes eurent lieu le 14 décembre pour le lac du Verdon/La Tessoualle-Maulévrier, le 21 décembre pour les sites ligériens, le lac de Maine/Angers-Bouchemaine et l'étang Saint-Aubin/Pouancé.

La couverture de la Loire en aval des Ponts-de-Cé et particulièrement sur le tronçon Ingrandes-Varades n'a pas été réalisée. Ce secteur accueille souvent plusieurs centaines de Mouettes rieuses *larus ridibundus* et quelques dizaines de goélands en dortoir.

Au lac de Maine, une tentative de décompte est entreprise le 7 décembre en plaçant des observateurs sur les multiples voies d'arrivée vers le lac. L'exercice — qui se serait avéré payant en l'absence de plans d'eau proches — est ici faussé par la présence d'inondations sur les prairies des Basses Vallées Angevines, au nord d'Angers. Des dortoirs

temporaires s'y forment et concernent surtout la Mouette rieuse, espèce opportuniste et prompte à réagir à de nouvelles conditions attractives.

L'exercice est répété le 21 mais là, ce sont de très mauvaises conditions météorologiques qui ne permettent pas la réalisation d'un décompte précis. Finalement, c'est un décompte réalisé le 20 par une personne qui est pris en compte.

2. Résultats et commentaires

La progression des effectifs de Goélands leucophées *Larus cachinnans* et surtout bruns *Larus fuscus* (tabl. 1 et 2) s'inscrit dans la logique de la progression nationale (CRÉAU & DUBOIS 1997), celle du second étant remarquable pour un département non littoral (MOURGAUD 1998). Le département de Maine-et-Loire se place au 4^e rang des départements français pour l'accueil de cette espèce derrière les départements des Landes (60 000), de la Gironde (16 000) et de la Vendée (5 838).

Le plus étonnant est la toujours faible présence du Goéland argenté *Larus argentatus* sur nos plans d'eau en hiver, ceux-ci ne semblant guère remonter au-delà d'Ancenis sur la Loire. Dans la région parisienne, ils ont depuis plusieurs années maintenant remonté la Seine et colonisé le département de Seine-et-Marne et

Espèces	1984	1997
Mouette rieuse	≥ 50 000	26 490
Goéland cendré	7	10
Goéland leucophée	} < 86	700
Goéland brun		4 500
Goéland argenté		10

Tableau 1. — Comparaison des décomptes de Laridés en Maine-et-Loire entre 1984 et 1997.

Site	Mouette rieuse	Goéland brun	Goéland leucophée	Goéland cendré	Goéland argenté
Lac de Maine	16 600	2 400	85		2
Lac du Verdon	5 000	1 654			
Loire à Saumur					
Petit Puy/Saumur	40	67	113		
Pont Cadre Noir/Saumur	2 000				
Loire à La Ménitré	100		500		
Étang St-Aubin/Pouancé	2 750	270	2	3	5
Total	26 490	4 391	700	3	7
Total estimé	26 500-28 000	≥ 4 500	≥ 700	5-10	≥ 10
Pays de Loire	175 605	12 839	800	2 163	55 599
France	1 163 553	96 657	123 416	73 326	229 097

Tableau 2. — Décompte des Laridés au dortoirs en décembre 1996 en Maine-et-Loire.

les Yvelines avec respectivement 1 948 et 3 680 individus en décembre 1997. Ils ont entraîné dans leur sillage les Goélands bruns (DUBOIS 1980) — le département de la Seine-et-Marne étant le deuxième département intérieur pour l'espèce.

L'effectif angevin de Mouettes rieuses est inférieur à celui dénombré en 1984 et aussi à ceux recensés régulièrement les hivers précédents, généralement proches de celui de 1984. La présence d'inondation sur les prairies des Basses Vallées Angevines les jours précédents est peut-être à l'origine d'une dispersion des hivernants vers d'autres zones humides.

Aucune Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* n'a été notée lors du recensement.

Sa présence a pourtant été constatée récemment en hiver au lac de Maine — 2-3 hivernants du 4 novembre 1991 au 11 mars 1992, 1 immature le 18 octobre 1992 et 1 adulte le 7 février 1993 — et au lac du Verdon — 1 ou 2 immatures les 7 novembre et 19 décembre 1993 et 2 adultes le 9 janvier 1994, présence d'un immature et d'un adulte le 5 février 1995 — (BEAUDOIN *et al.* 1996, 1997, 1998).

Sa présence au sein de bandes de plusieurs milliers de Mouettes rieuses est souvent difficile à déceler et seuls les individus qui se tiennent sur les bordures des groupes peuvent être identifiés. □

Remerciements

À tous ceux qui ont participé aux comptages : J.-Cl. BEAUDOIN, F. BERLAND, C. BERTHELOT, D. BIZIEN,

P. BIZIEN, J.-P. BOISDRON, C. BOURGET, B. BUONO, J.-P. BURON, J.-Fr. CORNUAILLE, H. COZANNET, J.-B. DE LA BRETÈQUE, D. FERRAND, A. FOSSÉ, Fr. HALLIGON, Fr. GABILLARD, V. LERAY, J.-M. LOGEAS, O. LOIR, G. MOURGAUD, Th. ROGER, E. SECHET. □

Bibliographie

- BEAUDOIN J.-Cl., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1996. — Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1991 à la nidification 1992 en Maine-et-Loire. *Crex*, 1 : 9.
- 1997. — Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. *Crex*, 2 : 9 et 16.
- 1998. — Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1994 à la nidification 1995 en Maine-et-Loire. *Crex*, 3 : 5-17.
- CRÉAU Y., DUBOIS Ph. J., 1997. — Recensement des Laridés hivernant en France. Hiver 1996-1997. *Ornithos*, 4 (4) : 174-183.
- DUBOIS Ph. J., 1980. — Premier cas d'hivernage du Goéland brun *Larus fuscus* en région parisienne. *Le Passer*, 17 : 53-55.
- MOURGAUD G., 1998. — Hivernage du Goéland brun *Larus fuscus* en Maine-et-Loire. *Crex*, 3 : 73-78.
- SAGOT P., 1985. — Recensement hivernal des Laridés hivernant en France (janvier 1984). GTOM, CRBPO. rapport dactylographié, non paginé. □

