

Première observation d'un Aigle pomarin *Aquila pomarina* en Maine-et-Loire

Frédéric JIGUET & Gilles MOURGAUD

Le 16 juillet 1999, nous parcourons la campagne de Méron à Montreuil-Bellay dans le cadre du suivi de la population locale d'Outardes canepetières *Tetrax tetrax*.

Alors que nous nous trouvons au nord de la zone industrielle, un rapace de grande taille passe en vol plané au-dessus de nos têtes. Il rejoint un peu plus loin une pompe de Bondrées apivores *Pernis apivorus* et se fait harceler par l'une d'elles.

La taille de notre oiseau en comparaison avec celle de la Bondrée (environ un tiers de plus en envergure), les ailes larges et digitées, la queue assez courte (environ la moitié de la largeur de l'aile) nous font immédiatement penser à un rapace du genre *Aquila*.

Le corps est massif avec une petite tête.

Les ailes longues paraissent carrées mais assez arrondies à leur extrémité. Les ailes sont tenues en cloche, en vol plané, les poignets sont un peu relevés de même que la pointe des rémiges primaires.

Vues de dessous, les rémiges sont brun-noir, de même que la queue. Les rémiges primaires internes sont de même couleur que les externes. Elles contrastent avec la coloration plus chaude des sous-couvertures, du cou et de la poitrine : mélange de plumes brunes et de plumes beiges à teinte un peu roussâtre.

La base des rémiges primaires externes est grisée, celle des grandes couvertures sous-alaires correspondantes également, formant ainsi une double virgule pâle sous le poignet de l'aile.

Vu de dessus, l'oiseau présente quatre couleurs. L'avant de l'aile est beige, formant une large plage pâle sur chaque aile. Le dos et le manteau sont bruns. Les rémiges et les rectrices sont brun-noir ou noirâtres. La base des rémiges primaires internes est blanche, ce qui forme un triangle très net au poignet de chaque aile. Une bande blanche étroite mais nette marque le croupion à la base de la queue.

La description correspond à celle d'un oiseau adulte ou subadulte.

Cette observation est validée par le Comité d'homologation national en 2000 (FRÉMONT & CHN 2000). Elle précède d'un peu plus d'un mois celle d'un adulte le 25 août à Saint-Seurin-d'Uzet en Gironde (FRÉMONT *op. cit.*), peut-être le même oiseau...

Les observations d'Aigles pomarins en France sont régulières chaque année et concernent quelques oiseaux isolés, et ce, depuis 1987. Seulement trois données étaient enregistrées auparavant (DUBOIS & CHN 1997). □

Bibliographie

- DUBOIS Ph. J., Comité d'homologation national, 1997. — Les oiseaux rares en France en 1995. *Ornithos*, 4 (4) : 148.
- FRÉMONT J.-Y., Comité d'homologation national, 2000. — Les oiseaux rares en France en 1999. *Ornithos*, 7 (4) : 152. □

Frédéric JIGUET
55, rue Buffon
75005 Paris
fjiguet@cimrs1.mnhn.fr

Gilles MOURGAUD
la Fardelière
49125 Tiercé
g.mourgaud@wanadoo.fr