

Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 2000 à la nidification 2001 en Maine-et-Loire

Jean-Claude BEAUDOIN, Alain FOSSÉ, Bruno GAUDEMER, Bruno LEGENDRE et Gilles MOURGAUD

Liste des observateurs ayant contribué à ce compte rendu

G. Agenet, M. Audouin, A. Bajan, G. Balesme, N. Baron, L. Barbotin, J.-Cl. Beaudoin, D. Beilleau, H. Berjon, F. Berland, D. Bizien, P. Bizien, M. Blond, R. Bodin, J.-P. Boisdron, S. Boivin, J.-M. Bottereau, A. Boulestreau, A. Boulet, Cl. Bourget, A. Bruggeman, B. Bueno, Fr. Cauet, M. Charrier, G. Coste, A. & L. Cottenceau, J.-Ph. Couasné, S. Courant, CPIE Loire et Mauges, P. Croué, A. & S. Dalloyeau, E. Douillard, D. Drouet, Fr. Dupin, D. Farges, D. Ferrand, A. Fossé, M. Fouquet, O. Gabory, Y. Gabory, Gr. Gadret, Br. Gaudemer, J. Girard, D. Goubaud, Y. Guenescheau, L. Guetté, Fr. Halligon, S. Harel, L. Hauchecorne, Cl. Héroguel, B. Hubert, J.-L. Jacquemin, Chr. Jolivet, G. Jolivet, L. Lahaye, G. Laurent, Br. Legendre, J.-P. Le Mao, V. Leray, L. Levallet, J.-M. Logeais, M.-M. Logeais, O. Loir, M. Lomont, W. Maillard, M. Masson, Mauges-Nature, B. Même-Lafond, M. Mérot, B. Moreau, G. Mourgaud, Fr. Noël, A. Pépion, D. Potaux, L.-M. Préau, Th. Printemps, R. Provost, P. Raboin, S. Robert, Th. Roger, N. Sacquin, S. Schubert, E. Séchet, S. Séchet, G. Séjourné, J. Tudoux, M. Vaslin, V. & O. Vimont, Cl. Violon, J.-D. Vrignault, Th. Williamson.

Sites ornithologiques en Maine-et-Loire avec leurs communes

Basses Vallées Angevines = BVA (prairies)/parties basses des vallées de la Sarthe, du Loir, de la Mayenne et de la Maine autour d'Angers
Baumette (prairies de la)/Sainte-Gemmes-sur-Loire
Beaulieu (forêt de)/Faye-d'Anjou
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon (49), Saint-Maurice-la-Fougereuse (79)
Bécon (étang de)/Saint-Léger-des-Bois

Bécon (forêt de)/Saint-Augustin-des-Bois
Bellay (grand étang du) = Hautes-Belles
Bigéard (île)/Saint-Laurent-du-Mottay
Blisière (étang de la)/Soudan (44)
Bois Montbourcher (étang du)/Chambellay
Boudré (landes de)/Seiches-sur-le-Loir
Bré (carrières de)/Seiches-sur-le-Loir
Brelaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Briançon (bois de)/Bauné
Buisson Marion (grève du)/Montjean-sur-Loire
Chambiers (forêt de)/Durtal, La Chapelle-Saint-Laud, Beauveau, Montigné-lès-Rairies
Chandelais (forêt de)/Le Guédéniau, Bocé, Pontigné, Lasse
Charpenterie (étangs de la)/Montreuil-sur-Loir
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
Clémencière (étang de la)/La Cornuaille
Courtrie (décharge de la)/Le Louroux-Béconnais
Cunault (étang de)/Chênehutte-Trêves-Cunault
Davier (prairies du)/Étriché-Juvardeil
Douces (plaine des)/Doué-la-Fontaine, Cizay-la-Madeleine
Douvy (plaine de)/Épiéds
Égout (étang de l')/Jarzé
Farauderie (étang de la)/La Meignanne
Ferrière (bois de la)/La Ferrière-de-Flée, L'Hôtellerie-de-Flée
Fonte (étang de la)/Saint-Michel-et-Chanveaux
Fourneau (étang du)/La Prévière
Garenne (parc de la)/Angers
Godinière (étang de la)/Cholet
Grip (étang du)/Durtal
Hautes Belles (étang des)/La Breille-les-Pins
Hauts (bois des)/Puy-Saint-Bonnet
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Houssaye (étang de la)/Tiercé
Joncs (étang des)/Lasse
Juigné (marais de)/Montreuil-Juigné

Launay (étang de)/Louresse-Rochemenier
 Leppo (forêt de)/Le Fief-Sauvin, Saint-Rémy-en-Mauges, Le Puiset-Doré
 Loges (étang/tourbière des)/Brain-sur-Allonnes
 Longuenée (forêt de)/Brain-sur-Longuenée, Saint-Clément-de-la-Place, La Membrolle-sur-Longuenée
 Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
 Maisonneuve (étang de)/Cléré-sur-Layon
 Malagué (étang de)/Chaumont-d'Anjou
 Maubusson (étang de)/Saint-Michel-et-Chanveaux
 Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
 Monnaie (forêt de)/Longué-Jumelles, Moulis-herne
 Mouettes (île aux)/Saint-Rémy-la-Varenne
 Moulin d'Ivray/Étriché
 Neuf (étang)/Saint-Michel-et-Chanveaux
 Noues (étang des)/Cholet
 Noyant (BVA) (prairies de)/Soulaire-et-Bourg, Cantenay-Épinard, Écouflant
 Oisellerie (étang de l')/Durtal
 Ombrée (forêt d')/Combrée, Grugé-l'Hôpital, Vergennes, La Chapelle-Hullin, Bourg-l'Évêque, Noyant-la-Gravoyère
 Pavillon (étang du)/Le Longeron
 Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois
 Perray (étang du)/Écouflant
 Petit Puy (bord de Loire)/Saumur
 Piard (étang de)/Le Louroux-Béconnais
 Pin (étang du)/Le Pin (44)
 Pointe (la)/Bouchemaine
 Pont Ménard (forêt de)/Vernantes, Linières-Bouton, Vernoil, Parçay-les-Pins
 Pré de l'Abbesse (le)/Cantenay-Épinard
 Primaudière (étang de la)/Armaillé
 Ribou (lac de)/Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
 Rillé (lac de)/Rillé, Channay-sur-Lathan (37), Breil (49)
 Rou-Marson (étang de)/Rou-Marson
 Saint-Aubin (île)/Angers
 Saint-Aubin (réservoir)/Pouancé
 Saint-Nicolas (étang)/Angers
 Selène (étang de)/Tiercé
 Septième (étang de la)/Saint-Crespin-sur-Moine
 Simorette (étang de la)/Durtal
 Singé (étang de)/La Chapelle-Saint-Laud
 Tau (vallée)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil
 Tressé (étang de)/Pouancé
 Vaux (prairies de)/Cantenay-Épinard
 Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49), Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)

Abréviations

- BVA : Basses Vallées Angevines ;
- env. : environ ;
- CHD/CHN + : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental ou national ;
- CHD/CHN ± : donnée en cours d'examen par le comité d'homologation départemental ou national ;
- CHD/CHN ? : donnée homologable non présentée au comité d'homologation départemental ou national ;
- date* : date soumise à homologation départementale depuis le 1^{er} janvier 1995 (v. Fossé 1996, 1998) ;
- espèce* : espèce soumise à homologation départementale depuis le 1^{er} janvier 1995 (v. Fossé 1996, 1998) ;
- espèce** : espèce soumise à homologation nationale ;
- étg : étang ;
- Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé ;
- Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

Note systématique

À la suite de la Commission de l'avifaune française (JIGUET & CAF 2004) nous plaçons maintenant les Ansériformes puis les Galliformes en tête des espèces.

De plus certains noms scientifiques ont été émendés afin de respecter l'accord grammatical (DAVID & GOSSELIN 2002a et b), on doit donc écrire pour les espèces de la liste de Maine-et-Loire :

- Oulette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* (et non plus *aegyptiacus*) ;
- Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (et non plus *hybridus*) ;
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (et non plus *urbica*) ;
- Tarier pâtre *Saxicola torquatus* (et non plus *torquata*).

Saison postnuptiale 2000

Août : dominé par un régime de S.-O. avec quelques passages orageux (les 11, 19 et 25) et entrecoupé de brèves périodes de flux de N. du 3 au 7 et de S.-E. du 22 au 24. Mois chaud (maximum de 34,3 °C à Angers le 25) et peu arrosé.

Septembre : flux assez frais d'O. à N.-O. jusqu'au 7, suivi d'une période chaude de N.-E. du 8 au 13 (32,2 °C à Angers le 11). La seconde moitié est soumise à des perturbations de S.-O. avec vents soutenus le 15 et de forts passages pluvieux les 18 et 28.

Octobre : sous l'influence d'un flux d'O. à N.-O. jusqu'au 9 puis de S.-O. à l'exception d'une brève période de régime de N. à N.-E. du 14 au 16 (vents assez forts de N.-O. le 9, très forts de S.-S.-O. le 10 et assez forts de S.-O. le 30). Mois doux et excédentaire en précipitations avec crue faible débutant le 12 et Maine à la cote de 1,59 m le 24.

Novembre : soumis à un flux instable de S.-O. (vents forts les 5, 6 et 22). Très doux (aucune gelée sous abri) et très pluvieux. Deux épisodes de crue avec Maine à 3,23 m le 10 puis à 4,46 m le 30.

Cygne noir *Cygnus atratus* : 1 à la Charpenterie du 26-7 au 26-8 puis 1 (le même ?) du 9-9 au 1-10 à Montreuil-Juigné, 2-3 sur la Loire aval (notamment vallée de la Tau à Saint-Florent-le-Vieil) du 22-10 au 13-2.

Oie cendrée *Anser anser* : premières signalées le 15-8 (vol nocturne à Valanjou) mais vrai début de la migration noté à partir du 15-10. Beaucoup d'oies en décembre (3 013 oies rapportées entre le 1^{er} et le 31 dont 1 929 dans la décade du 29-11 au 8-12).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : passage sensible à la fin d'octobre au lac de Maine et au lac du Verdon.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* : 1 000 le 29-8 au Thoureil, 448 le 7-9 au lac de Maine, 350 le 17-9 aux gravières de Bré, 432 le 17-9 au Petit Puy à Saumur, 135 le 17-10 à l'étang de Beaurepaire.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : dernière observée le 10-9 aux gravières de Bré.

Canard souchet *Anas clypeata* : maximum de 116 le 19-10 au lac du Verdon et seulement 15 le 22-10 au lac de Maine.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : maximum de 62 le 7-11 au lac de Maine.

Caille des blés *Coturnix coturnix* : encore un chanteur le 11-9 près de Louresse-Rochemenier.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : 63 le 18-7 puis 33 le 21-8 à l'étang de Beaurepaire ; 29 le 10-9 sur les gravières des Bretonnières ; au moins une vingtaine à l'étang des Hayes en septembre-octobre.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : ≥ 1 115 au Petit Puy et 550 au lac de Maine le 16-10 ; 720 au lac de Maine le 1-11 ; 11 contrôles de 7 oiseaux bagués (Danemark, France et Pays-Bas, âgés de 3 mois et 14 jours à 5 ans, 4 mois et 14 jours, Fossé 2006).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : réapparition sur la boire des Trois Œufs le 14-7 (1 ad.) jusqu'au 27-8 (maximum de 4 oiseaux ensemble).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : réapparition au lac de Maine le 21-9 (2 individus).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 44 à Saumur le 24-8.

Grande Aigrette *Ardea alba* : réapparition de l'espèce à la mi-juin (1 le 11-6 à Noyant et 1 — la même ? — le 21-6 au Moulin d'Ivray). Un juvénile le 30-6 à Cheffes avait été bagué 44 jours auparavant (le 17-5) au lac de Grand Lieu (44). 5 au Thoureil le 17-9, 4 les 23-26-9 puis 5 le 4-10 à l'étang des Hayes.

Héron cendré *Ardea cinerea* : 73 le 17-9 au Petit Puy.

Héron pourpré *Ardea purpurea* : dernière observation le 26-9 (1 juvénile à l'étang des Hayes).

Cigogne noire *Ciconia nigra* : 8 en vol à Saumur le 22-8 ; dernière le 13-9 (Saint-Lambert-des-Levées).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : passage du 16-7 au 23-9 (groupes de 38 les 25 et 26-8 à Montreuil-Juigné, 17 le 30-8 à Beaupréau) ; 1 juvénile le 8-8 à Soulaire-et-Bourg avait été bagué le 1-5 en Charente-Maritime (Fossé 2006).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : 1 à Cunault le 16-8, 1 près de Saint-Sulpice le 25-8 et 1 près du Thoureil le 27-8 (observations pouvant concerner des nicheurs).

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : régulièrement noté du 8-7 au 1-11. En Loire amont, sur le trajet La Daguinière – Saint-Rémy-la-Varenne, 4 ou 5 à partir du 30-7, 5 ou 6 en août et septembre puis à l'unité. Parmi les oiseaux bagués repérés, 1 juvénile, probablement bagué dans l'Orléanais, est vu le 1-9 près de Montsoreau. Rappelons aussi que 2 oiseaux britanniques munis d'émetteurs ont fait halte ou ont survolé le département de Maine-et-Loire en septembre (Fossé 2003).

Faucon émerillon *Falco columbarius* : 1 sur la plaine de Douvy le 19-10

Faucon hobereau *Falco subbuteo* : dernière observation le 16-10 près de la Pointe/Bouchemaine.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : deux mentions en juillet (1 adulte près de Montreuil-Bellay le 11 et 1 juvénile le 18 à l'étang de Beaurepaire) puis 1 le 20-8 à Cholet et 1 adulte sur l'île Saint-Aubin le 28-10.

Grue cendrée *Grus grus* : effectif exceptionnel de **148** volant vers le sud-ouest le 2-12 près de La Chapelle-Saint-Florent.

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : 40 le 15-9 sur les sites de nidification.

- Huïtier pie *Haematopus ostralegus*** : observé sur la Loire du 29-7 au 30-9 (maximum de 30 en vol le 13-8 à La Chapelle-Saint-Florent, troupe la plus importante en Maine-et-Loire).
- Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*** : observée du 24-7 au 30-12 (maxima de 40-42 à Saint-Laurent-du-Mottay le 3-9, 51 le 7-10 à La Bohalle et ≥ 60 le 16-12 à Saumur).
- Petit Gravelot *Charadrius dubius*** : deux derniers le 7-10.
- Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*** : observé du 22-7 au 30-9 (maximum de 19 le 4-9 au Thoureil).
- Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus**** : 1 le 20-9 entre La Daguenière et La Bohalle (CHD +).
- Pluvier doré *Pluvialis apricaria*** : premiers le 22-10.
- Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*** : observé du 8-8 au 20-9.
- Bécasseau maubèche *Calidris canutus*** : observé du 24-7 au 9-9.
- Bécasseau sanderling *Calidris alba*** : 3 données du 6-8 au 1-9.
- Bécasseau minute *Calidris minuta*** : observé du 22-7 au 7-10.
- Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii**** : plusieurs observations du 6-8 (date record égalée) au 6-9 concernant 1 ou 2 individus (le ou les mêmes ?) puis 1 le 22-9 entre La Daguenière et La Bohalle (CHD +).
- Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*** : observé du 23-7 au 29-9 (maximum de 10 le 26-8 à Chênehutte-Trèves-Cunault).
- Bécasseau variable *Calidris alpina*** : observé du 10-7 au 21-10 (maximum de 16 le 22-9).
- Combattant varié *Philomachus pugnax*** : observé du 24-7 au 21-10 (maximum de 31 le 26-8).
- Bécassine des marais *Gallinago gallinago*** : observée à partir du 27-7.
- Bécasse des bois *Scolopax rusticola*** : première donnée le 26-10.
- Barge à queue noire *Limosa limosa*** : 21 dès le 1-6 à La Bohalle sont déjà sans doute en train de redescendre sinon observée du 22-6 au 29-9 (+ 2 oiseaux tardifs le 1-11 à La Bohalle).
- Courlis corlieu *Numenius phaeopus*** : observé du 24-7 au 16-9 (maximum de 7 le 1-8 entre La Daguenière et La Bohalle).
- Courlis cendré *Numenius arquata*** : observé du 16-8 au 21-9.
- Chevalier arlequin *Tringa erythropus*** : observé du 12-8 au 27-9 (maximum de 4 le 28-8).
- Chevalier gambette *Tringa totanus*** : observé du 22-6 au 27-10 (maxima de 50 + 24 + 83 le 25-6 entre La Daguenière et Montsoreau et de 68 le 24-7 entre La Bohalle et Saint-Mathurin-sur-Loire).
- Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis**** : 1 juvénile à La Daguenière le 17-9 (CHD +, 5^e donnée angevine et 1^{re} donnée postnuptiale homologuée, la donnée du 2-9-94, non documentée, n'étant pas retenue, BEAUDOIN *et al.* 1998).
- Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*** : observé du 24-6 au 6-10 (maximum de 40 le 26-8).
- Chevalier sylvain *Tringa glareola*** : observé du 19-7 au 13-9 (maximum de 8 le 11-8).
- Tournepieuvre à collier *Arenaria interpres*** : 3 données d'un individu du 26-8 au 6-9 entre La Bohalle et Saint-Mathurin-sur-Loire.
- Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus**** : 1 juvénile le 23-8 à Saint-Mathurin-sur-Loire (3^e donnée angevine — après celles de 1980 et 1990 (prochaine en 2010 ?) — et date la plus précoce, CHD +).
- Labbe parasite *Stercorarius parasiticus**** : 1 possible juvénile à La Daguenière le 1-8 (CHD ?).
- Goéland brun *Larus fuscus*** : 800 à 900 dès le 19-7 au dortoir du lac du Verdon et plus de 2 000 à l'étang des Noues le 29-8 et 250 au dortoir du lac de Maine le 6-10.
- Goéland leucopnée *Larus michahellis*** : 700 le 3-10 au dortoir de Saumur et 250 au dortoir du lac de Maine le 30-10.
- Sterne caspienne *Sterna caspia*** : relative abondance avec 5 données entre le 30-7 et le 10-9 et un maximum de 3 ensemble (les 30-7 et 10-9 entre Saint-Mathurin-sur-Loire et La Bohalle).
- Sterne caugek *Sterna sandvicensis*** : 1 dès le 3-6 au marais de Montreuil-Juigné.
- Sterne arctique *Sterna paradisaea**** : 1 adulte à La Bohalle le 31-8 (CHD +).
- Sterne naine *Sterna albifrons*** : 2 le 21-9 au lac de Maine puis un oiseau très attardé le 7-11* au lac du Verdon (CHD +, la mention la plus tardive jusque-là remontait au 4-10-84).
- Guifette noire *Chlidonias niger*** : dernière le 16-10 au lac de Maine.
- Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus**** : 1 juvénile le 20-8 à La Bohalle (CHD +).
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*** : encore 20 le 1-10 près de Milly.

Coucou gris *Cuculus canorus* : 2 tardifs le 24-9 à Briollay (date record le 26-9-88).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : 1 le 6-9 à Cholet.

Alouette des champs *Alauda arvensis* : 2 000 au passage dans la matinée du 22-10 au Puy Saint-Bonnet.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 1 immature tardif le 22-10* près de Chalonnes-sur-Loire (CHD +).

Gobemouche gris *Muscicapa striata* : 1 attardé le 18-10* à Angers (CHD ?, date la plus tardive auparavant : 12-10-84).

Mésange noire *Parus ater* : quelques oiseaux en déplacement près de La Chapelle-Saint-Florent du 31-10 au 10-11.

Moineau soulcie *Petronia petronia* : 39 le 1-10 sur l'abbaye de Fontevraud.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : 2 le 21-10 près de Chaudron-en-Mauges.

Hivernage 2000-2001

Décembre : dominé par un flux instable de S. à S.-O. jusqu'au 27 suivi d'une période fraîche de N.-O. Mois encore très arrosé et particulièrement doux (3 jours de gelée et maximum de 19 °C à Angers le 7 soit la température la plus élevée depuis 1946). Légère décrue puis nouvelle montée des eaux à partir du 28.

Janvier : soumis à une forte instabilité de S.-O. (vents assez forts les 23-24) entrecoupée de deux périodes fraîches à froides du 6 au 15 et à partir du 27 (minimum à Angers de -2,6 °C le 30). Deux crues se succèdent dans le mois (Maine à 5 m le 7 puis à 4,20 m le 30).

Février : redoux de S.-O. du 2 au 8 (vents forts le 6) puis période froide de N. à N.-E. jusqu'au 20 puis de N.-O. avec quelques averses de neige du 25 au 27 (minimum de -3,9 °C à Angers le 25). Crue moyenne culminant le 9 (Maine à 3,83 m) puis retrait partiel des eaux.

Cygne noir *Cygnus atratus* : voir saison postnuptiale.

Bernache cravant *Branta bernicla* : 2 le 16-12 au lac de Maine.

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca** : 1 adulte à la Charpenterie le 20-1 (CHD +).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : belles troupes de 20 le 16-12 à Montreuil-Juigné et 14 le 14-1 en vallée de la Tau.

Canard siffleur *Anas penelope* : 595 le 27-12 à l'île Saint-Aubin, 360 le 13-1 au lac du Verdon et 398 le 22-1 à l'île Saint-Aubin.

Canard chipeau *Anas strepera* : maximum de 49 le 31-12 à l'île Saint-Aubin et 23 le 14-1 aux gravières de Bré.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 450 le 31-12 au lac de Maine et l'île Saint-Aubin, 220 le 7-1 au lac du Verdon et 250 le 4-2 à Tiercé.

Canard pilet *Anas acuta* : hivernage important avec 395 le 23-12 et maximum de 405 le 14-1 à l'île Saint-Aubin.

Canard souchet *Anas clypeata* : maximum de 119 le 30-12 sur l'île Saint-Aubin.

Nette rousse *Netta rufina** : 1 couple le 11-2 sur la Maine à Angers (CHD +).

Fuligule milouin *Aythya ferina* : 580 le 28-12 au lac de Maine.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*** : 1 mâle adulte en éclipse probable du 3 au 8-11 au lac de Maine (CHN +, FRÉMONT & CHN 2003, seconde mention angevine après celle du 28-1-00 au lac du Verdon).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca** : 1 mâle du 26-12 au 19-2 entre le lac de Maine, le marais de Juigné et l'étang de Chevigné (CHD +).

Fuligule milouinan *Aythya marila** : 1 mâle immature et 1 femelle le 11-11 à l'étang de la Primaudière (CHD +) et 1 mâle 1^{er} hiver du 26-12 au 2-1 au lac de Maine (CHD +).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : 1 individu le 20-1 à Écouflant.

Harle piette *Mergus albellus* : 1 le 10-2 aux gravières de Bré.

Harle huppé *Mergus serrator** : 2 femelles/immatures le 18-11 au lac de Maine (CHD +).

Plongeon catmarin *Gavia stellata* : 1 au lac du Verdon du 30-12 au 13-1.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* :

Décompte Wetlands International 13-14-1-01	
8 étas du Searéen	56
lacs du Verdon & Ribou	40
3 étas des Mauaes	17
2 étas du Bauaeois	24
2 étas du Saumurois	8
Loire amont et Thouet à Montreuil-Bellay	9
2 aravières du Val de Loir	12
marais de Montreuil-Juigné	3
lac de Maine et BVA	20
Total	189

Comptages des Grands Cormorans aux dortoirs, hiver 2000-2001
(avec le concours des agents de l'ONCFS et du Conseil supérieur de la pêche)

	14•10•00	11•11•00	16•12•00	15•1•01	17•2•01	17•3•01
Val de Loire						
Petit Puy/Saumur	1000	60	25	102	0	60
Le Breil/Saumur	0	0	185	88	182	48
Gennes	100	160	77	43		75
Île Mézangeon/La Daguenière	0	3	0			
La Daguenière	0	40	0	74		
Île de Chalennes	0	0	0	0	0	
Île de Montravers/Chalennes	0	82	64	130	154	42
Île Monsieur/St-Germain-des-Prés	11	0	0		0	
Île Bataillon/Montjean-sur-Loire	20	0	0	6	0	
Le Buisson/Montjean-sur-Loire	63	55	22		0	0
Lac de Maine	550	350	270	275	275	
Val de Mayenne et abords						
Bois Montbourcher	0	0	0			
Champteussé-sur-Baconne	0	100	0	53		
Grez-Neuville	0	117	0	168		
Cantenay-Épinard	0	0	0			
Val de Sarthe						
Étriché	1	0	132	64	0	42
Cheffes	107	85	16	44	0	
Val de Loir						
Bré/Seiches-sur-le-Loir	0	0	0	2		
La Charpenterie/Montreuil-sur-Loir	0	0	0	0		
Segréen						
Étang de la Clémencière				17		
Mauges						
Lac de Ribou	0	157	159	268		
Total	1 852	1 209	950	1 334	611	267

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : légère réduction des dortoirs par rapport aux années précédentes ; contrôles de 2 oiseaux bagués à Grand Lieu, âgé de 8 mois et 26 jours à 5 ans, 8 mois et 24 jours (Fossé 2006). 2 probables carbo (angles gulaires < 60 %, MILLINGTON 2005, NEWSON *et al.* 2005) photographiés le 29-12 au lac de Maine www.digimages.info/gracor/gracor.htm#291200.

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* : de 6 à 10 oiseaux au dortoir du lac de Maine tout l'hiver.

Grande Aigrette *Ardea alba* : 5 le 16-1 à l'étang de Beaurepaire ; jusqu'à 5 à l'étang de Chevigné le 28-1.

Milan royal *Milvus milvus* : 1 près de Feneu le 14-1.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : 13 le 11-11, au moins 5 les 26-11 et 17-12 et 6 le 25-2 au dortoir du camp de Fontevraud.

**Décompte national des Anatidés
(Wetlands International)
des 13 et 14 janvier 2001**

	Canard siffleur	Canard chipeau	Sarcelle d'hiver	Canard colvert	Canard pilet	Canard souchet	Fuligule milouin	Fuligule morillon
Segréen								
Étg de Cheigné*			25	50		6		8
Étg de Saint-Aubin	2		1	75				
Étg du Fourneau				30			11	22
Étgs Neuf et de la Fonte			33					
Étg de Maubusson*			10	10			60	20
Mauges								
Lacs du Verdon et de Ribou	360		220	500			60	
Étg de Beaurepaire			3	69			52	
Baugeois								
Étg de la Houssaye							3	2
Étgs de Singé			39	3				
Étg des Hayes				9			2	
Val de Loire et Basses Vallées Angevines								
Loire autour de Saumur*				72			34	
Loire de La Ménitrie au Thourel*				800				
Gravières de Bré		23	11	365		2	5	2
Lac de Maine et abords*	4	26	98	562				
Île Saint-Aubin*	234	12	24	38	405		67	
Autres sites de Maine-et-Loire	89		10	555	2	2	441	20
Totaux	689	61	474	3 138	407	10	735	74
	Canards siffleurs	Canards chipeaux	Sarcelles d'hiver	Canards colverts	Canards pilets	Canards souchets	Fuligules milouins	Fuligules morillons

* sites retenus comme sites nationaux lors du recensement hivernal des oiseaux d'eau

Faucon émerillon *Falco columbarius* : des isolés mentionnés de 3 sites (camp de Fontevraud, forêt de Beaulieu et La Possonnière) entre les 11-11 et 25-2.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : des isolés observés entre les 21-11 et 17-3 sur 4 sites (lac du Verdon, vallée de la Tau, lac de Maine et BVA où l'espèce donne lieu à au moins 6 observations).

Rôle d'eau *Rallus aquaticus* : 3 sur l'hippodrome de Verrie le 13-2.

Foulque macroule *Fulica atra* :

Décompte Wetlands International 13-14-1-01	
8 étgs du Segréen	393
lacs du Verdon & Ribou	1 021
3 étgs des Mauges	168
2 étgs du Baugeois	122
2 étgs du Saumurois	40
Loire amont et Thouet à Montreuil-Bellay	7
2 gravières du Val de Loir	79
marais de Montreuil-Juigné	150
lac de Maine et BVA	786
Total	2 766

Grue cendrée *Grus grus* : 15 le 22-12 près de Saint-Rémy-la-Varenne et 1 posée près de Soulaire-et-Bourg le 28-12.

Huitrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 le 27-1 à Saint-Lambert-des-levées.

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : 34 le 6-1 à Bouchemaine, troupe la plus importante notée en hiver en Maine-et-Loire (auparavant, env. 20 le 15-1-87, DROUET *et al.* 1988, GABORY 1998).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus** : 1 immature le 18-2 à Beaupréau (quatrième donnée — et première hivernale — en Maine-et-Loire, CHD +).

Bécasseau variable *Calidris alpina* : 8 données du 3-12 au 11-2 (maxima de 30 le 27-12 à Tiercé et de 30 le 19-1 en vallée de la Tau).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : 1 le 11-11 à Tiercé et 4 le 29-12 sur l'île Saint-Aubin.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : 1 le 3-12 à Chênehutte-Trèves-Cunault et 1 le 15-12 à l'étang de Beurepaire.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : maxima de 62 le 15-12 et 66 le 13-2 à Beurepaire.

Coullis cendré *Numenius arquata* : une seule donnée d'un individu le 26-12 à Tiercé.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : 2 données hivernales d'un individu les 26-11* à Saint-Germain-des-Prés (CHD ?) et 16-12* au lac de Maine (CHD +).

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : en dortoir 2 000 sur l'étang Saint-Aubin le 11-11, au moins 15 000 au lac de Maine le 10-12, 10 000 entre Soulaire et Briollay le 26-12 et au moins 10 000 au lac du Verdon le 29-12.

Goéland brun *Larus fuscus* : plus de 1 850 au dortoir de l'étang Saint-Aubin le 11-11. Au dortoir du lac de Maine, de 850 le 31-10 à 2 350 le 8-12 puis 3 850 le 2-1 et encore 1 800 le 1-3. Les effectifs records sont notés au lac du Verdon avec **au moins 8 000** le 29-12.

Goéland argenté *Larus argentatus* : maximum de 5-6 dont 2-3 adultes à la déchetterie de la Courtrie le 27-1.

Goéland leucopnée *Larus michahellis* : 200 le 8-12 au dortoir du lac de Maine et plus de 100 à celui du lac du Verdon le 29-12.

Goéland marin *Larus marinus** : 1 immature de 1^{er} hiver à l'étang Saint-Aubin le 11-11 (CHD +), 1 adulte au lac de Maine les 2 et 4-1 (CHD +) accompagné d'un immature de 1^{er} hiver. Ce dernier sera présent jusqu'au 11-1 et revu les 4 et 28-2 (CHD +).

Pigeon colombin *Columba oenas* : env. 600 le 7-11 et env. 1 200 le 16-12 au dortoir du lac de Maine. Env. 300 le 11-11 près de Bécon-les-Granits.

Effraie des clochers *Tyto alba guttata* : une trouvée morte le 18-12 près de Genneteil avait été baguée adulte le 10-6-97 dans le nord des Pays-Bas.

Hibou moyen-duc *Asio otus* : 36 le 11-11, 46 le 17-12 et maximum de 51 le 13-1 à l'hippodrome de Verrie.

Hibou des marais *Asio flammeus* : 1 le 6-1 dans la Champagne de Méron, 1 le 9-2 et le 6-3 sur l'hippodrome de Verrie.

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris** : 1 en chasse toute la journée du 23-12 à Saint-Vincent/Chalonnnes-sur-Loire (CHD +, 2^{nde} donnée angevine après celle de Saint-Florent-le-Vieil du 2 au 9-1-00, BEAUDOIN *et al.* 2003 ; retour du même oiseau ?).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 2 stationnent le 8-12* près de Seiches-sur-le-Loir (CHD ?), 1 immature le 30-12* près de Soucelles (CHD +) et 1 le 1-1* près de Montreuil-sur-Loir (CHD ?).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* : env. 1 000 au dortoir de Carrefour Saint-Serge/ Angers le 30-12 et 650-700 au dortoir du pont Cessart/Saumur le 8-1 (sous-espèces non précisées).

Moineau soulcie *Petronia petronia* : en dortoir moins de 20 tout l'hiver sur l'abbaye de Fontevraud en raison

des travaux, 8 le 21-2 près du golf de Roiffé (86) et 7 sur le château de Brézé (nouveau site) le 25-2.

Grosbec casse-noyaux *Coccythraustes coccythraustes* : afflux sensible dans tout le département. 13 données recueillies entre le 11-11 et le 3-2 concernent des effectifs le plus souvent inférieurs à la dizaine à l'exception d'un groupe de 20 le 17-1 à Neuillé.

Saison prénuptiale 2001

Mars : régime assez froid de N. à N.-E. jusqu'au 5 suivi d'une longue période de flux instable de S.-O. avec vents souvent assez soutenus. Mois très doux et extrêmement arrosé (127,8 mm à Angers soit le record depuis l'ouverture de la station météorologique en 1946). Forte crue avec Maine à 5,45 m et Loire aux Ponts-de-Cé à 4,19 m le 23.

Avril : instabilité de S.-O. jusqu'au 4 puis d'O. à N.-O. jusqu'au 21 où reprend le régime de S.-O. Mois assez frais et encore très pluvieux avec décrue lente puis nouvelle montée des eaux dans les derniers jours (Maine à 2,55 m et Loire aux Ponts-de-Cé à 2,42 m le 27).

Mai : temps assez chaud de S. à S.-S.-O. (orages le 2) puis flux de N.-E. à E. jusqu'au 13. Brève instabilité de S.-O. puis retour à un régime de N.-E. calme et frais jusqu'au 24 avant une reprise de l'instabilité de S.-O. (maximum de 30,7 °C à Angers le 28). Forte crue culminant le 11 (Loire aux Ponts-de-Cé à 4,55 m et Maine à près de 5 m) suivie d'une décrue lente laissant un niveau assez élevé dans les derniers jours (Maine à 1,50 m le 28).

Cygne noir *Cygnus atratus* : 2 au lac de Maine du 11 au 14-3 (sans doute ceux ayant hiverné sur la Loire aval) puis 1 le 17-6 à La Possonnière.

Oie cendrée *Anser anser* : passage du 31-1 au 24-3 (pic dans la dernière décade de février dont 1 185 le 23-2). Donnée étonnante d'un vol de 100 le 23-5 à Saint-Sigismond.

Bernache nonnette *Branta leucopsis** : 2 erratiques du 11 au 15-6 sur l'île Saint-Aubin (CHD +).

Bernache cravant *Branta bernicla* : 1 le 1-4 sur le lac de Ribou.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : 14 le 21-4 puis 20 le 26-4 en vallée de la Tau, 10 le 23-4 à la Baumette, 2 le 6-5 à Cheffes.

Canard siffleur *Anas penelope* : passage sensible dans la 3^e décade de février sur les BVA avec 550 individus observés le 21-2.

Canard chipeau *Anas strepera* : passage migratoire sensible au début de mars avec 55 individus le 7-3 sur l'île Saint-Aubin.

Canard pilet *Anas acuta* : passage sensible dans la 3^e décade de janvier avec 750 individus le 29-1 sur l'île Saint-Aubin puis plus important dans la 3^e décade de février et début mars avec 2 752 individus le 24-2 puis 1 675 le 7-3 sur le même site.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : première le 13-2 à l'étang de Beaurepaire.

Canard souchet *Anas clypeata* : passage sensible de la 2^e décade de février à la 1^{re} décade de mars avec 120 individus le 25-2 puis 114 le 7-3 sur l'île Saint-Aubin.

Nette rousse *Netta rufina** : 1 mâle les 31-3 et 1-4 dans la vallée de la Tau (CHD ?).

Fuligule milouin *Aythya ferina* : départ des hivernants à la fin de janvier et passage sensible mi-février avec 300 individus le 16-2 au marais de Juigné.

Fuligule milouinan *Aythya marila** : 1 femelle le 4-3 au Pré de l'Abbesse (CHD +).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : 1 mâle le 5-4 à Saint-Jean-de-la-Croix.

Caille des blés *Coturnix coturnix* : 3 mentions de chanteurs assez précoces entre les 4-4 et 8-4 dans le Saumurois et en vallée de La Tau.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : premiers le 7-3 (2 sur l'île Saint-Aubin) et dernier le 20-5 à l'étang des Hayes.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : 2 contrôles de 2 oiseaux bagués (France et Pays-Bas, âgés de 9 mois et 8 jours, et 9 mois et 26 jours, Fossé 2006).

Blongios nain *Ixobrychus minutus** : 1 le 15-4 à La Ménitrie (CHD ?).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides** : 1 adulte le 15-5 à Chalonnes-sur-Loire (CHD +, 5^e donnée angevine).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : 3 derniers le 2-5 en vallée de la Tau.

Grande Aigrette *Ardea alba* : 4 dernières le 24-4 en vallée de la Tau.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : première le 25-1 au Louroux-Béconnais, dernières le 21-6 (8, groupe maximal du printemps, à Saint-Augustin-des-Bois).

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : 1 immature du 1 au 9-6 sur Briollay et Soulaire-et-Bourg (CHD +).

Dates de première observation en 2001

	1961-2000						1961-2000				
	2001	record	moy.	n	éc.-type		2001	record	moy.	n	éc.-type
Sarcelle d'été	13*2	2*2*85	3*3	39	9	Hirondelle rustique	10*3	15*2*98	14*3	39	8
Caille des blés	4*4 ?	2*4*95	30*4	32	10	Hir. de fenêtre	25*3	3*3*00	29*3	33	11
Blongios nain	15*4	20*3*80	15*5	26	18	Pipit rousseline	1*5	5*4*93	4*5	19	20
Bihoreau gris		11*3*94	15*4	17	24	Pipit des arbres	30*3	16*3*87	1*4	34	7
Héron pourpré	1*4	23*3*79	9*4	32	7	Berg. printanière	10*2*	26*2*91	29*3	39	9
Cigogne noire	11*3	3*3*90	26*3	20	22	Berg. flavéole	25*3	22*3*87	8*4	30	9
Spatule blanche	12*3	22*1*93	25*3	15	30	Berg. pr. nordique		9*4*83	24*4	11	10
Bondrée apivore	27*4	21*3*92	27*4	34	14	Rosignol philomèle	1*4	22*3*97	6*4	38	6
Milan noir	10*3	21*2*85	18*3	33	18	Gorgebleue à miroir		21*3*68	10*4	3	27
Circaète J.-le-Blanc	8*4	17*3*79	9*4	29	17	R. à front blanc	22*4	7*3*94	3*4	37	13
Busard cendré	3*4	11*3*90	12*4	32	9	Tarier des prés	21*4	8*3*92	11*4	36	13
Aigle botté		12*4*82	8*5	7	21	Traquet motteux	16*3	23*2*98	20*3	38	13
Balbusard pêcheur	17*3	15*3*00	9*4	22	15	Merle à plastron		10*3*95	11*4	17	13
Faucon hobereau	15*4	22*3*91	14*4	32	9	Locustelle tachetée	8*4	9*3*86	10*4	29	10
Râle des genêts	10*4	14*3*99	12*4	36	10	Locustelle lusciniôide		13*4*63	29*4	15	14
Mar. ponctuée	3*3 ?	27*2*89	5*5	12	33	Phragmite des joncs	25*3 ?	25*3*00	12*4	35	10
Outarde	17*3	3*3*85	5*4	23	18	Rouss. verderolle		22*5*97	3*6	6	15
Petit Gravelot	24*3 6*3 ?	1*3*97	24*3	39	12	Rouss. effarvatte	27*4	13*4*96	24*4	27	7
Barge à queue noire	14*2	22*1*89	8*2	40	10	Rouss. turdoïde		19*4*73	11*5	11	15
Sterne pierregarin	7*3	4*3*98	23*3	39	9	Hypolaïs polyglotte	23*4	20*4*88	28*4	31	6
Sterne naine	18*4	30*3*97	28*4	36	11	Fauvette grisette	30*3	28*3*76	6*4	38	7
Guifette moustac	3*4 ?	4*4*00	1*5	30	14	Fauvette des jardins	28*3	28*3*81	16*4	31	10
Guifette noire	25*4	7*4*72	22*4	37	8	Pouillot de Bonelli	15*4	21*3*93	9*4	33	10
Tourterelle des bois	20*4	25*3*73	18*4	38	11	Pouillot siffleur	12*4	2*4*94	22*4	29	9
Coucou gris	11*3	25*2*94	24*3	38	10	Pouillot fitis	23*3	3*3*85	25*3	38	8
Petit-duc scops		8*4*91	28*4	8	15	Gobemouche gris	1*5	8*4*73	2*5	30	12
Engoulevent d'Europe	8*5	1*4*86	1*5	24	14	Gobemouche noir	7*4*	14*4*91	24*4	18	9
Martinet noir	2*4	2*4*95	12*4	40	5	Loriot d'Europe	28*4	8*4*90	26*4	36	8
Huppe fasciée	23*3	5*3*92	27*3	36	11	P.-gr. écorcheur	8*5	15*4*90	9*5	23	9
Torcol fourmilier	8*4	3*3*97	22*4	26	19	P.-gr. à tête rousse	20*5	21*4*95	10*5	10	11
Hirondelle de rivage	18*2*	25*2*78	22*3	39	15	Bruant ortolan		13*4*90	10*5	8	15

*donnée homologuée par CHD, ? donnée non parvenue au CHD

- Spatule blanche *Platalea leucorodia*** : passage noté du 12-3 au 10-6 (troupe maximale de 12 le 25-5 à Saint-Mathurin-sur-Loire).
- Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*** : 9 mentions d'isolés entre les 17-3 et 29-4 puis 2 mentions en mai, les 19 et 24. La plupart des oiseaux sont vus sur la Loire à l'exception d'un le 8-4 près de Pouancé et d'un autre le 24-5 sur l'île Saint-Aubin.
- Faucon émerillon *Falco columbarius*** : 4 données de femelles ou d'immatures dans le Saumurois entre les 13-4 et 1-5.
- Marouette ponctuée *Porzana porzana*** : 1 chanteur brièvement entendu sur les BVA le 3-3.
- Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*** : 6 le 14-3 et 1 le 15-4 à Saumur.
- Échasse blanche *Himantopus himantopus*** : observée du 23-3 (date la plus précoce, auparavant le 1-4-99) au 25-5 (maximum de 7 à la Baumette le 17-4).
- Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*** : observée du 23-3 au 9-6 (maximum de 10 le 25-4 à Montsoreau).
- Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus*** : première donnée le 8-2.
- Petit Gravelot *Charadrius dubius*** : premiers le 6-3.
- Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*** : hormis 4 le 25-2 à Soulaire-et-Bourg, observé du 21-4 au 4-6 (maximum de 8 le 16-5 à Denée).
- Pluvier doré *Pluvialis apricaria*** : derniers le 11-3 (maximum de 9 700 le 28-2 sur les BVA).
- Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*** : observé du 10-3 au 31-5.
- Bécasseau maubèche *Calidris canutus*** : 3 données du 22-4 au 31-5.
- Bécasseau sanderling *Calidris alba*** : observé du 8-5 au 31-5.
- Bécasseau minute *Calidris minuta*** : 3 données du 13-5 au 9-6.
- Bécasseau variable *Calidris alpina*** : observé du 8-3 au 24-5 (maximum de 17 le 8-3).
- Combattant varié *Philomachus pugnax*** : observé du 4-2 au 18-3 (maximum de 34 le 25-2) puis du 15-4 au 19-5 (maximum de 146 le 21-4 sur les BVA).
- Bécassine des marais *Gallinago gallinago*** : dernières le 23-4 (maximum de 128 le 17-3 à Châteauneuf-sur-Sarthe).
- Bécasse des bois *Scolopax rusticola*** : dernier contact le 19-1.
- Barge à queue noire *Limosa limosa*** : réapparition le 14-2 (350 sur les BVA à Noyant). Maximum de 11 800 le 28-2 sur les BVA. Dernière le 22-4 à La Possonnière.
- Courlis corlieu *Numenius phaeopus*** : 4 données du 22-4 au 26-5 (maximum de 3 les 22-4 et 26-5).
- Chevalier arlequin *Tringa erythropus*** : observé du 8-3 au 15-4.
- Chevalier gambette *Tringa totanus*** : observé du 26-2 au 9-6 (maximum de 40 le 22-4).
- Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*** : observé du 13-4 au 3-6 (maximum de 40 le 26-4).
- Chevalier sylvain *Tringa glareola*** : observé du 8 au 16-5.
- Tournepièce à collier *Arenaria interpres*** : 2 le 1-5 à Saint-Rémy-la-Varenne, 1 à Chalonnes-sur-Loire le 6-5 et 3 à La Daguinière le 9-6 (date pré-nuptiale la plus tardive, auparavant le 8-6-90).
- Grand Labbe *Catharacta skua**** : 1 le 8-4 sur le communal de Tiercé (CHD +, 4^e donnée angevine).
- Goéland marin *Larus marinus**** : 1 adulte mazouté au lac de Maine le 11-3 (CHD +) et un adulte/subadulte sur le même site les 1^{er} et 11-3 (CHD +).
- Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*** : 15 passent en vol à la Pointe le 1-4. Des observations régulières ensuite durant tout le mois sur les prairies inondées de la vallée de la Loire aval.
- Mouette tridactyle *Rissa tridactyla**** : 1 H1 au lac de Maine le 22-3 (CHD +).
- Sterne caugék *Sterna sandvicensis*** : 2 adultes le 14-5 à la Pointe.
- Sterne pierregarin *Sterna hirundo*** : arrivée précoce le 7-3 avec 2 oiseaux à la Pointe. 135 au lac de Maine le 6-4.
- Guifette moustac *Chlidonias hybrida*** : arrivée à une date record le 3-4* en vallée de la Tau avec 7 oiseaux (CHD ?, précédent record le 4-4-00). Maximum de 10 sur ce même site le 4-4*(CHD ?).
- Guifette noire *Chlidonias niger*** : maximum de 30 le 3-6 entre Saint-Rémy-la-Varenne et La Bohalle.
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia*** : un individu arrivé à une date record – le 18-2* – à Champtoceaux (CHD +, record précédent le 22-2-98).
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava*** : 1 très précoce le 10-2* près de Corzé (CHD +, précédente date record le 26-2-91). Des mâles de type « centratlantique » *Motacilla fl. flava* x *iberiae* le 15-4 dans la vallée de la Tau et le 22-5 près d'Écouflant. Aussi sur les BVA 1 mâle d'aspect *iberiae* le 28-4 et 1 mâle d'aspect *cinereocapilla* le 29-4.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 1 chanteur près de Saint-Germain-des-Prés le 25-3* (CHD ?, égalant le record de 2000).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* : 1 chanteur près du Louroux-Béconnais le 28-3 (date égalant le record du 28-3-81) et 1 près de Cheffes le 1-4.

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus** : 1 mâle chanteur observé et enregistré les 23 et 24-5 à la Porterie du Mesnil/Loiré (CHD +, 1^{re} donnée angevine).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : 4 données de mâles entre les 7-4* (CHD +, nouvelle date record, auparavant le 14-4-91) et 24-4.

Blongios nain *Ixobrychus minutus** : 1 m. chanteur de retour à l'étang des Hayes du 27-5 au 2-7 (CHD ?).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 3 ou 4 individus à Turquant du 22-6 au 9-7 (simple dispersion postnuptiale ?).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : transport de matériaux (sans suite) au lac de Maine les 11 et 15-3.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : au moins 8 (9 ?) nids au lac de Maine (3 nids en 2000, année de la première nidification) ; 6 couveurs le 2-6 et 8 nids avec poussins le 11-7.

Grande Aigrette *Ardea alba* : 1 le 28-6 à la Charpenterie (estivage d'un non-reproducteur ou début de dispersion postnuptiale ?).

Héron cendré *Ardea cinerea* : rassemblements de 114 le 4-6 à Noyant et 125 le 10-6 sur l'île Saint-Aubin pouvant correspondre aux oiseaux (adultes et jeunes) des colonies de Cantenay-Épinard, Cheffes et lac de Maine.

Nidification et estivage 2001

Juin : assez frais d'O. à N.-O. jusqu'au 3 puis longue période chaude avec flux d'E. à S.-E. dominant et accompagné de quelques passages orageux (les 5 et 6, 15 et 28). Mois très sec (10,2 mm à Angers) et chaud, particulièrement dans les 11 derniers jours (33,9 °C à Angers le 25). La décrue est générale.

Juillet : très chaud et orageux jusqu'au 6 puis instabilité d'O. avec fortes pluies et températures fraîches du 12 au 18. Rétablissement d'un temps sec et chaud dans la dernière décade.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : 1 adulte/5 juvéniles le 24-5 en vallée de la Tau, 1 couple/3 juvéniles le 10-6 à Montjean-sur-Loire.

Canard chipeau *Anas strepera* : de nouvelle nidification durant le mois de juin à l'étang des Hayes donnant seulement 1 juvénile.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* : nidification la plus précoce le 22-4 au marais de Juigné (1 femelle avec 13 juvéniles), nidification la plus tardive le 4-8 à Denée (2 adultes avec 5 juvéniles).

Canard souchet *Anas clypeata* : 1 femelle avec 4 juvéniles le 4-6 dans la vallée de la Tau à Saint-Laurent-du-Mottay.

Fuligule milouin *Aythya ferina* :

Sites	Nb nichées	Nb poussins
Étg du Pavillon	2	5
Étg des Hayes	2	11
Total	4	16

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : 7 (3 juv.) à Panreux/Montreuil-Bellay le 3-5 ; 16 c. à l'étang de Beaurepaire le 12-6.

Sites des héronnières	Nb nids
lac de Maine	18
Cheffes	25
Longué-Jumelles	21
Varennes-sur-Loire	10
La Daguenière	7
Le Louroux-Béconnais	32
Cantenay-Épinard	≥ 19
Total	≥ 132

Héron pourpré *Ardea purpurea* : ≥ 1 juvénile/1 ou 2 nids sur un site.

Cigogne noire *Ciconia nigra* : 1 ou 2 c. possibles mais pas de preuves de reproduction. 2 adultes et 1 immature de 1^{er} été à Saint-Hilaire Saint-Florent le 11-6.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : 1 à 4 oiseaux (2 bagués métal) sur les BVA du 18-5 au 15-6 avec parades indiquant un cantonnement (sans suites apparentes).

Milan noir *Milvus migrans* : 2 couples sur des îles de la Loire amont (île de Mézangeon/La Daguenière et île Trotouin/Dampierre-sur-Loire), 2 couples sur les BVA à l'écart des sites connus (près de Morannes et Cantenay-Épinard), 3 couples dans le Segréen (étangs de la Brelaudière et du Fourneau et nord de Freigné), 1 couple dans les Mauges (décharge de La Séguinière) et 1 couple dans le Saumurois (bois de la Dame/Montreuil-Bellay). Présence de 15 oiseaux autour de la déchetterie du Louroux-Béconnais le 28-4.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : seulement 2 couples nicheurs possibles signalés (étangs des Hayes et de Beaurepaire).

Busard cendré *Circus pygargus* : au cours du suivi réalisé dans le Saumurois, 42 couples repérés (établis dans des cultures à l'exception de 3 cantonnés dans des landes) ; 36 nids ont donné plus de 103 poussins dont au moins 37 n'ont pas survécu. Sur 41 poussins protégés, 28 ont pu s'envoler. Aucun indice de reproduction ailleurs dans le département.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* : 4 mentions de reproduction réussie (1 dans le Baugeois, 1 dans le Saumurois et 2 dans deux massifs des Mauges). Le 9-4 en lisière de la forêt de Chandelais un adulte poursuit un Héron cendré qui vient se poser non loin de l'observateur...

Aigle sp. *Aquila sp.** : 1 individu (possible Aigle royal *Aquila chrysaetos*) le 26-5 sur le communal de Tiercé (CHD + pour *Aquila sp.*).

Rôle des genêts *Crex crex* : sur les BVA un décompte partiel recense 86 à 98 chanteurs et permet une estimation de l'ordre de 110 chanteurs sur l'ensemble. Cette valeur extrêmement faible, jamais encore atteinte depuis la mise en place de comptages au début des années quatre-vingt, semble attribuable pour l'essentiel à la forte crue de mai qui a recouvert tout le site et, peut-être aussi, à un succès de reproduction très moyen en 2000. Une diminution catastrophique est d'ailleurs enregistrée sur tous les autres sites majeurs français (Noël 2002). Une quinzaine de chanteurs dans le Val de Loire entre Saint-Jean-de-la-Croix et Saint-Florent-le-Vieil à l'occasion de dénombrements partiels.

Foulque macroule *Fulica atra* : 45 couples cantonnés et 34 adultes non nicheurs le 15-5 sur l'étang de Beaurepaire.

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : 15 mâles sur la Champagne de Méron et la plaine de Douvy le 22-5 et 16 mâles considérés stables sur l'ensemble du site durant le suivi. En outre 1 mâle régulier près de Doué-la-Fontaine et des oiseaux apparaissant sur 4 autres sites (Nueil-sur-Layon, Les Verchers-sur-Layon, Louresse-Rochemenier et Antoigné).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : 2 croulent le 3-6 en forêt de Pont Ménard. Une enquête ONCFS sur la croule montre sur 11 points d'écoute les résultats suivants : v. tableau ci-contre.

Coullis cendré *Numenius arquata* : 1 couple du 4-3 au 20-5 à Saint-Germain-des-Prés sans autre indice de reproduction que des alarmes et des parades. 1 ou 2

en vallée de la Tau jusqu'au 21-7 (reproduction ?). 4 le 4-6 à Soulaire-et-Bourg (reproduction ?).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* : 1 adulte avec 2 poussins (demi-taille adulte) le 18-6 sur l'île Ardouin/Saumur.

Pour les Laridés, les années se suivent et se ressemblent. Les crues et les assèchements prématurés des bras secondaires perturbent une nouvelle fois considérablement la reproduction des Laridés sur la Loire. Les crues de fin mars puis de fin avril ne laissent que peu de sites disponibles pour les mouettes. Ensuite, la baisse rapide de la Loire fin mai, début juin provoque une connexion des grèves aux berges permettant un accès aisé des prédateurs et des promeneurs. Enfin, un épisode orageux survenu dans le secteur de Montsoreau le 6 juin anéantit une bonne partie des nichées.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : aucun couple ne s'installe sur les grèves de Loire cette année. Le site de Montsoreau qui accueillait 25 couples en 2000 n'a permis l'observation que de quelques oiseaux non reproducteurs.

Goéland leucophée *Larus michahellis* : 11 couples se reproduisent sur la Loire. 5 couples à Parnay, 4 sur l'île aux Mouettes et deux en aval de Saint-Mathurin. Seuls les couples de Parnay produisent au moins 6 jeunes.

Goéland argenté *Larus argentatus* : sur l'île de Parnay un couple élève avec succès un jeune, âgé de 3,5 semaines le 23-7. Il s'agit du premier cas de reproduction de cette espèce en Maine-et-Loire.

Goéland brun *Larus fuscus* × Goéland leucophée *Larus michahellis* : après plusieurs années de présence d'au moins un adulte de Goéland brun et de tentatives d'appariement au sein de la colonie de Goélants leucophées, un couple mixte produit deux jeunes à Parnay.

Vaulandry	2
La Breille-les-Pins	1 + 0 + 0
Courléon	1 + 4
Lué-en-Baugeois	0
Le Guédéniau	0 + 0
Durtal	0
Veziens	0

Comptages de Bécasses des bois à la croule.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : seulement 87 couples sur la Loire. Seul le site de Saint-Mathurin avec 25 couples produit une dizaine de poussins. À Montsoreau, les crues de fin mars puis de fin avril n'ont permis l'installation que d'un petit nombre de couples. L'épisode orageux du 9-7 a anéanti les quelques couvées présentes. Sur la gravière de la Charpenterie, 20 nids le 19-5 et au moins 15 juvéniles à l'envol le 9-7.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* : 8 volant vers l'ouest à La Daguenière le 9-6 et 2 adultes près de Bouchemaine le 10-6.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : 397 couples sont dénombrés sur la Loire amont. La production de jeunes est très variable selon les sites. Les 170 couples installés à Montsoreau voient leurs nichées quasi toutes anéanties début juin à la suite d'un épisode orageux. Seule une quinzaine de juvéniles survivent à l'intempérie. 45 couples de Saint-Mathurin produisent une quarantaine de juvéniles. 40 couples sont recensés sur les piles de ponts des Ponts-de-Cé (9 familles avec 22 poussins le 10-6). Enfin, la zone du Petit Puy à Saumur avec 8 couples produit 18 jeunes. Ailleurs, l'île aux Mouettes héberge une colonie de près de 100 couples début juin mais est raccordée à la berge les jours suivants empêchant toute réussite dans la reproduction. Hors Loire, au moins 6 couples sont dénombrés dans les gravières de Bré et 15 juvéniles y sont notés le 15-7.

Sterne naine *Sterna albifrons* : l'effectif nicheur avoisine les 110 couples en Loire amont : 14 à Saint-Mathurin, 10 à La Bohalle, 30 à l'île aux Mouettes, 16 à Saumur, 11 à Parnay et 28 à Montsoreau. Seul le site de Saumur voit une production de jeunes dépassant la dizaine (32 poussins le 9-7). En Loire aval, 8 couveurs sont notés au Buisson Marion le 16-5.

Chevêche d'Athens *Athens noctua* : 15 chanteurs sur 2 375 ha autour de Chazé-sur-Argos lors d'un comptage les 1^{er}, 7 et 15-3.

Martinet noir *Apus apus* : pour la 3^e année consécutive (ROGER & FOSSÉ 2001), nidification arboricole d'un couple à Angers.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster** : 1 en vol le 3-7 au-dessus d'Antoigné (CHD ?) et 1 le 5-7 en vol au-dessus de la forêt de Pont Ménéard (CHD +, 5^e donnée angevine).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : en mai jusqu'à 5 chanteurs dans le massif de La Breille-les-Pins et 1 chanteur dans celui de Pont Ménéard.

Pic noir *Dryocopus martius* : en milieu périurbain, un individu présent le 17-3 dans le parc de Pignerolle/Saint-Barthélemy.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : recensement partiel des colonies :

Dates	Sites	Nb trous occupés
4-4	Gravière de l'Épinay/Le Louroux-Béconnais	20
15-4	Le Lion Vert/Montjean-sur-Loire	12
10-5	Grav. des Bretonnières/Montreuil-sur-Loire	50
22-6		30
10-6	Grav. du Sol de Loire/Montjean-sur-Loire	10
11-6	Île Ardouin/Saint-Hilaire Saint-Florent	100
18-6	Île de Parnay	10
22-6	Carrière de Doué-la-Fontaine	5
22-6	Coteau des Vignoles/Turquant	50

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : parmi les colonies recensées les plus étoffées sont celles du bourg d'Ingrandes (180 nids), du pont de Montjean-sur-Loire (155 nids) et du bourg de Saint-Florent-le-Vieil (103 nids).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : pas d'indices de nidification dans le camp de Fontevraud.

Bergeronnette printanière *Motacilla fl. flava* : 1 couple cantonné le 29-5 et par la suite dans une jachère près d'Antoigné puis avec un juvénile le 9-7. En Maine-et-Loire il s'agit du premier cas de reproduction en plaine agricole à l'écart du réseau de prairies alluviales. Aussi 1 mâle sur la plaine de Douvy le 18-6.

Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima* : 1 mâle près de Tiercé le 26-5.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* : 1 femelle adulte à la date inhabituelle du 15-6* près de La Bohalle (CHD +).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 1 chanteur le 8-5 à Saint-Lambert-des-Levées, 4 chanteurs en mai dans le massif de La Breille-les-Pins et 1 couple nicheur et 4 chanteurs en mai dans Saumur.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : 1 couple nourrissant 1 juvénile le 23-6 près de Doué-la-Fontaine sur le site classique de la plaine des Douces.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* : développement des effectifs avec notamment 9 chanteurs sur les BVA dont 4 le 10-7 sur l'île Saint-Aubin et 8 chanteurs sur le camp de Fontevraud. 1 couple construisant un nid dans du ray-grass le 20-4 sur la Champagne de Méron.

Locustelle tachetée *Locustella naevia* : 4 chanteurs sur 3 sites des BVA et 7 chanteurs sur 4 sites du Baugeois.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 1 chanteur en vallée de la Tau/Montjean-sur-Loire le 1-6 et 3 chanteurs sur les BVA dont 1 sur la prairie du Davier le 5-6.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* : signalée du bois de la Graine de Sapin/Breil (1 couple et 2 chanteurs le 12-4) et du bois de la Frappinière/Cossé-d'Anjou (1 mâle les 22 et 29-4).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* : seulement 4 mentions. 1 chanteur le 20-5 en forêt de Monnaie, 1 chanteur le 9-6 dans un petit parc du N.-O. d'Angers, 1 chanteur, non loin, le 1-7 au parc de la Garenne et 1 chanteur le 10-7 près de Meigné.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* : entre autres 2 chanteurs le 4-6 en forêt de Beaulieu et 6 chanteurs et 1 adulte nourrissant le 24-6 en forêt de Pont Ménard.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : la seule mention concerne 1 chanteur le 24-6 près de Montreuil-Bellay sans preuve de nidification.

Mésange noire *Parus ater* : les données fournies se rapportent à 1 chanteur au parc de la Garenne, 1 couple avec mâle chanteur et femelle construisant le nid le 12-4 en forêt de Chandélais et 1 le 10-6 en forêt de Milly.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : à proximité de la vallée de la Sarthe 1 couple près de Feneu et 1 autre près de Châteauneuf-sur-Sarthe, en vallée de l'Authion 12 couples entre Vivy et Varennes-sur-Loire (régression suite aux aménagements fonciers), dans le Sud des Mauges 6 couples localisés (4 près du Puy Saint-Bonnet, 1 près de Saint-Paul-du-Bois et 1 près de Coron), dans le Baugeois au moins 8 couples sur 5 communes en périphérie du massif de Pont Ménard et 1 couple près de Breil ; enfin, dans le Saumurois, au moins 4 couples sur des sites classiques.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* : 1 adulte possible le 2-5* près de Noyant (CHD + pour *Lanius* sp.).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* : 1 couple les 20 et 21-05 au Puy Saint-Bonnet mais pas de preuve de

nidification par la suite.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : en dehors des rares sites habituels, des oiseaux mentionnés les 21 et 24-4 à Fontevraud et le 10-8 près de Neuillé sont sans doute des nicheurs locaux.

Moineau soulcie *Petronia petronia* : 32 posés à proximité de l'abbaye de Fontevraud le 26-3 et au moins 4 le 15-4 sur le coteau de Montsoreau. Les recensements des nicheurs indiquent au moins 12 couples sur l'abbaye de Fontevraud et ses abords et 4 couples au golf de Roiffé (86). □

Bibliographie

- ALLARD E., 2001. — Climatologie de l'Anjou au cours de l'année 2000. *Bull. annuel du comité météorologique départemental*, 51 : 47-76.
- BEAUDOIN J.-Cl., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1998. — Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1994 à la nidification 1995 en Maine-et-Loire (avec compléments 1993-1994). *Crex*, 3 : 5-17.
- BEAUDOIN J.-Cl., FOSSÉ A., GAUDEMER Br., HALLIGON Fr., MOURGAUD G., 2003. — Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1998 à la nidification 2000 en Maine-et-Loire. Compléments et corrections pour la nidification 1998. *Crex*, 7 : 3-23.
- CENTRE MÉTÉO-FRANCE, 2002. — Climatologie de l'Anjou au cours de l'année 2001. *Bull. annuel du comité météorologique départemental*, 52 : 61-89.
- DAVID N., GOSSELIN M., 2002a. — Gender agreement of avian species names. *Bull. Brit. Orn. Cl.*, 122 (1) : 14-49.
- DAVID N., GOSSELIN M., 2002b. — The grammatical gender of avian genera. *Bull. Brit. Orn. Cl.*, 122 (4) : 257-282.
- DROUET D., GABORY O., HERSAN D., JOLIVET Chr., 1988. — *L'Édicnème criard* *Burhinus oedecnemus*. *Résultats d'un recensement en milieu bocager (Maine-et-Loire, 1988)*. Éd. Carrefour touristique et culturel des Mauges. 60 p.
- Fossé A., 1996. — Comité d'homologation départemental. *Crex*, 1 : 47-52.
- Fossé A., Comité d'homologation départemental, 1998. — Les oiseaux rares, anachroniques ou

- d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1995. *Crex*, 3 : 19-28.
- Fossé A., 2003. — Des Balbuzards pêcheurs *Pandion haliaetus* britanniques en transit en Maine-et-Loire en 1999 et 2000. *Crex*, 7 : 71-74.
- Fossé A., 2006. — Contrôles de bagues en Maine-et-Loire (saison postnuptiale 2000-nidification 2001). *Crex*, 9 : 21-24.
- FRÉMONT J.-Y., CHN, 2002. — Les oiseaux rares en France en 2000. Rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 9 (1) : 2-33.
- FRÉMONT J.-Y., CHN, 2003. — Les oiseaux rares en France en 2001. Rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 10 (2) : 49-83.
- GABORY O., 1998. — L'hivernage de l'Édicnème criard *Burhinus oedicephalus* dans le Nord-Ouest de la France. *Crex*, 3 : 65-72.
- JIGUET Fr., CAF, 2004. — En direct de la CAF. Décisions récentes prises par la Commission de l'avifaune française. *Ornithos*, 11 (5) : 230-245.
- MILLINGTON R., 2005. — Identification of North Atlantic and Continental Cormorants. *Birding World*, 18 (3) : 112-123.
- MOURGAUD G., 2001. — Programme expérimental de sauvegarde de l'Outarde canepetière et de la faune associée en France. Rapport annuel technique, scientifique et d'activités. Union européenne, Ministère de l'Environnement, Conseil régional des Pays de la Loire., LPO Anjou. 11 p.
- NEWSON St., EKINS Gr., HUGHES B., RUSSELL I., SELLERS R., 2005. — Separation of North Atlantic and Continental Cormorants. *Birding World*, 18 (3) : 107-111.
- NOËL Fr., 2002. — Nouveau déclin du Rôle des genêts en France. *Ornithos*, 9 (3) : 127.
- ROGER Th., Fossé A., 2001. — Nidifications arboricole et rupestre du Martinet noir *Apus apus* en Maine-et-Loire. *Crex*, 6 : 21-29. □

Jean-Claude Beaudoin
3, allée des Aulnes
49080 Bouchemaine
jean.claude.beaudoin@wanadoo.fr

Alain Fossé
1, allée Alexandra-David-Néel,
49460 Montreuil-Juigné
alfosse@wanadoo.fr

Bruno Gaudemer
22, rue de l'Orée-du-Bois
49610 Mûrs-Érigné
b.gaudemer@laposte.net

Bruno Legendre
2, allée des Cerisiers
49290 Chalonnes-sur-Loire
bruno.legendre@tele2.fr

Gilles Mourgaud
la Fardelière
49125 Tiercé
g.mourgaud@wanadoo.fr

Corrections et compléments des faits marquants 1998–2000 (Crex n° 7)

• Saison postnuptiale 1999 (Crex n° 7 : 13-15)

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : 1 juvénile, bagué [LBNW(8A);RBM(G8347)] le 22-6-99 en Écosse, trouvé blessé par plombs le 9-10 à Fontevraud-l'Abbaye (soit 102 jours et 1 065 km plus tard) sera confié pour soins à l'École vétérinaire de Nantes. La fracture de sa patte consolidera mais il mourra en volière quelques mois plus tard (D^r Emmanuel Risi *in litt.*).

• Saison pré-nuptiale 2000 (Crex n° 7 : 17-19)

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : 3 adultes en vol le 1-3 près de Saint-Jean-de-la-Croix.

• Nidification 2000 (Crex n° 7 : 20-22)

Busard cendré *Circus pygargus* : 56 couples repérés entre Saint-Rémy-la-Varenne et la limite S.-E. du département. 45 nids localisés (essentiellement dans des parcelles de blé, 2 dans des ray-grass et 3 dans de la lande). 42 nids ont donné plus de 96 poussins dont 45 n'ont pas survécu (absence de campagnols). Sur 55 poussins protégés, 32 ont pris leur envol.

Rôle des genêts *Crex crex* : sur les BVA la répétition des crues tardives a provoqué un délai considérable dans l'installation des nicheurs. Les effectifs

observés sur quelques sites (Tiercé, Soulaire, la Baumette) sont faibles en comparaison des années antérieures. En l'absence de comptage exhaustif les estimations réalisées permettent d'envisager la présence de seulement 100 à 150 chanteurs. Le suivi des fauches de juin à août a permis de surveiller 140 parcelles et d'observer 105 oiseaux de taille adulte et 72 jeunes. À des fins de baguage un chanteur, 11 adultes en mue et 51 jeunes sont capturés. Un des adultes, présent près de Soulaire, avait été bagué jeune en 1998 près de Cantenay-Épinard.

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : supprimer la mention de 4 jeunes dès le 27-4 en vallée de la Tau/Saint-Florent-le-Vieil.

Moineau soulcie *Petronia petronia* : 3 couples à Montsoreau, 12-15 couples sur l'abbaye de Fontevraud et 4-5 couples au golf de Roiffé. Ce dernier site est localisé en Vienne à 2 km au S.-E. de l'abbaye et la nidification y est constatée pour la première fois en 1998 (GUIGNARD 2000). L'apparition sur de nouveaux sites est à relier aux travaux de restauration conduits à partir de 1998 sur l'abbaye de Fontevraud. □

Bibliographie

GUIGNARD P., 2000. — Nidification du Moineau soulcie *Petronia petronia* dans le nord de la Vienne depuis 1998 : le retour. *L'Outarde*, 41 : 3-8. □