

Les formes de Bergeronnettes printanières *Motacilla flava* nichant en Maine-et-Loire

Jean-Claude BEAUDOIN

Au cours de la période récente les effectifs de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava* se reproduisant sur le territoire français ont connu une dynamique fortement positive (+ 88 % d'après les résultats du STOC sur la période 1989-2007, JIGUET 2008). Un tel essor implique des évolutions des aires de répartition de ses formes géographiques et des contacts entre celles-ci se traduisant par l'apparition de mâles aux aspects intermédiaires dont les caractéristiques sont précisées dans la stimulante mise au point que leur a consacrée DUBOIS (2001). Certains mâles de ces formes intermédiaires pouvant, en outre, ressembler à des mâles appartenant à des sous-espèces se reproduisant hors des limites de l'Europe.

Ces dernières années, des recherches influencées par ce travail mais réalisées sans caractère très systématique, ont permis un certain nombre de constats sur la présence, au sein des mâles ayant l'aspect de la **sous-espèce nominale *flava*** — très majoritaires parmi les oiseaux nicheurs de Maine-et-Loire — d'individus présentant des caractères distincts de cette forme. De tels constats n'ont rien de très nouveau puisque des observations réalisées dès les années 1960 avaient montré la présence de mâles à l'aspect de la **Bergeronnette flavéole *M. f. flavissima***, sous-espèce occupant en France des secteurs souvent côtiers depuis le Nord - Pas-de-Calais jusqu'à la Bretagne. Six mentions de mâles de cette forme dont quatre de nicheurs certains proviennent de la période 1965-1987 (DUBOIS 2001). Par la suite des recherches plus intensives, menées en 2003 et 2004, montrent que la fréquence de tels individus demeure peu élevée puisque seulement trois ou quatre mâles de type

flavéole sont signalés sur les Basses Vallées Angevines dont un, en 2004, apparié à une femelle *flava* (et un autre en 2006)¹, à l'aspect un peu aberrant, évoquant une femelle ou un mâle immature de la sous-espèce de Sibérie orientale *taivana* (Philippe J. Dubois d'après Alain Fossé) !

Trois mentions, entre 1999 et 2002, concernent des mâles ayant l'aspect de la **Bergeronnette ibérique *M. f. iberiae*** dont l'aire de répartition la plus proche se situe en Aquitaine et Charente-Maritime et qui pourrait connaître une phase d'expansion vers le nord (DUBOIS 2001). Les observations de mâles à aspect intermédiaire concernent surtout des mâles de **forme « centratlantique », résultant de l'hybridation entre les sous-espèces *flava* et *iberiae*** et dont l'identification peut-être délicate comme celle de l'oiseau angevin photographié en 1992 et illustré sur la figure 21 de l'article de DUBOIS (*op. cit.*).

Enfin deux mentions, récoltées en 1990 et 2002, concernent des mâles de **Bergeronnette « de la Manche », forme intermédiaire entre *flava* et *flavissima***. De tels oiseaux ont un aspect déroutant et celui de 1990 s'était vu un temps attribuer les caractères de la Bergeronnette des steppes *M. f. beema* d'Asie centrale (DUBOIS & CHN 1991, figure 13 dans DUBOIS 2001). □

Remerciements

À Alain Fossé et Franck Noël qui ont contribué à la récolte de données depuis 2002.

¹ v. photos sur

<http://www.digimages.info/berpri/berpri.htm#taivana>
et <http://www.digimages.info/berpri/berpri.htm#180406>

Bibliographie


DUBOIS Ph. J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G., YÉSOU P., 2008. — *Nouvel Inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris, 560 p.

DUBOIS Ph. J., Comité d'homologation nationale, 1991. — Les observations d'espèces soumises à

homologation nationale en 1990. *Alauda*, 59 (4) : 225-247.

JIGUET Fr., 2008. — Suivi temporel des oiseaux communs. Bilan du programme STOC pour la France en 2007. *Ornithos*, 15 (2) : 73-83.

Bulletins et fichiers du Groupe angevin d'études ornithologiques et de la LPO Anjou. □



Dessin d'Olivier Loir

Jean-Claude Beaudoin
 3, allée des Aulnes
 49080 Bouchemaine
jean.claude.beaudoin@wanadoo.fr