

## Compléments aux chroniques saisonnières de l'hivernage 1988-1989 à la nidification 1992

Jean-Claude BEAUDOIN

### Hivernage 1988-1989

**Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens*** : 1 oiseau capturé près d'Andard le 20.11.88 vient d'être homologué comme présentant les caractères de ce type (DUBOIS & CHN 1996). Le CHN précise que « ... certains critères diagnostiques de *tristis* n'ont pu être vérifiés en main... ». En effet, l'auteur de la capture qui a photographié ce pouillot pensait alors avoir à faire à un oiseau de race *abietinus* (Michel GYS, comm. orale).

### Nidification 1991

**Marouette ponctuée *Porzana porzana*** : 1 chantant en vol le 7.6 après 23 h au-dessus de la boire de la Cartraie/Cantenay-Épinard (Vadim ZOUBOFF). L'émission du chant en vol est mentionné par CRAMP & SIMMONS (1979).

### Hivernage 1991-1992

**Fuligule milouin *Aythya marila*** : 1 femelle sur l'étang de Beaurepaire le 2.12 (Michel FOUQUET).

**Bécasseau variable *Calidris alpina*** : présence régulière sur l'étang de Beaurepaire, très bas, avec maximum de 27 le 21.1 (Michel FOUQUET).

**Goéland argenté *Larus argentatus*** : 1 immature de 1<sup>er</sup> hiver sur l'étang de Beaurepaire le 21.1 (Michel FOUQUET).

### Saison pré-nuptiale 1992

**Échasse blanche *Himantopus himantopus*** : 1 couple le 27.4 à l'étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

**Bécasseau maubèche *Calidris canutus*** : 1 le 11.5 à l'étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

**Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*** : 1 le 11.5 à l'étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

**Torcol fourmilier *Jynx torquilla*** : un groupe de 4 en avril ou mai dans un jardin de Saumur (Fabien DORTEL).

**Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*** : 60 le 2.3 à l'étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

### Nidification 1992

**Fuligule milouin *Aythya ferina*** : 6 nichées sur l'étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

**Petit Gravelot *Charadrius dubius*** : 8 couples nicheurs certains et 4 probables sur l'étang de Beaurepaire, très favorable en raison de son niveau bas (Michel FOUQUET).

**Vanneau huppé *Vanellus vanellus*** : 12 couples (7 nichées observées) autour de l'étang de Beaurepaire (Michel FOUQUET).

**Guifette moustac *Chlidonias hybridus*** : 3 adultes et 4 juvéniles le 1.9 sur le marais de Montreuil-Juigné. Les jeunes volants sont nourris par les adultes sur des plates-formes flottantes semblant correspondre à des nids (Philippe BOISTEAULT).

La nidification sur place paraît vraisemblable car les liens avec les parents sont de courte durée après l'envol selon la littérature (CRAMP 1985, TROTIGNON *et al.* 1994). L'observation de jeunes non émancipés au début de septembre n'a rien d'exceptionnel chez cette espèce qui, en France, peut avoir une période de reproduction très étalée (TROTIGNON *loc. cit.*).

Rappelons que la Guifette moustac niche très sporadiquement en Maine-et-Loire. Ainsi, en 1970, quelques couples se sont reproduits dans un marais du lac de Maine et, depuis, des cantonnements éphémères, avec transports de matériaux, ont été signalés sur deux secteurs de prairies inondées tardivement en 1978 et 1983.

### Bibliographie

CRAMP St., SIMMONS K. E. L. (eds), 1979. — *The Birds of the Western Palearctic*. Vol. II. Oxford university press, Oxford : 549.

CRAMP St. (ed), 1985. — *The Birds of the Western Palearctic*. Vol. IV. Oxford university press, Oxford : 140-141.

DUBOIS Ph. J., COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL, 1996. — Les oiseaux rares en France en 1995. *Ornithos*, 3 (4) : 153-175.

TROTIGNON J., WILLIAMS T., HÉMERY G., 1994. — Reproduction et dynamique des colonies de la population de Guifettes moustacs *Chlidonias hybrida* de la Brenne. *Alauda*, 62 (3) : (89-104) 169-184.

Bulletins du Groupe angevin d'études ornithologiques n° 6, 28 et 37. □