

## Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1995

Alain FOSSÉ et le comité d'homologation départemental 49

### Introduction

L'homologation a officiellement commencé pour les observations réalisées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1995. Ce premier rapport du comité d'homologation départemental de Maine-et-Loire (CHD 49) couvre donc essentiellement l'année 1995 : 33 fiches ont ainsi été examinées pour 1995 (90,9 % ont été homologuées). À ces fiches ont été ajoutées — pour lancer le travail du comité — 1 fiche pour 1992 (homologuée), 4 pour 1993 (75 % homologuées) et 16 pour 1994 (100 % homologuées) soit au total 88 fiches (93,2 % homologuées).

La composition du CHD 49 était la suivante : Jean-Claude BEAUDOIN, Alain FOSSÉ, Alain GENTRIC, Victor LERAY, Thierry PRINTEMPS, Thierry ROGER, Francis CAUET, Gilles MOURGAUD, Olivier LOIR.

En 1997, Jean-Paul LE MAO a rejoint le groupe (qui comprend ainsi 10 personnes).

Après les homologations départementales sont présentées les homologations (et les non-homologations) concernant des observations réalisées dans notre département de 1981 à 1995 et publiées par le comité d'homologation national (CHN).

**Résumé : Ce premier rapport du CHD 49 résume les observations réalisées de 1992 à 1995.**

**Il faut retenir :**

- pour 1993 la première mention de l'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* et de la Fauvette babillarde *Sylvia curruca*, la troisième mention du Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* ;
- pour 1994 la troisième mention du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* ;
- pour 1995 la seconde mention de la Glaréole à collier *Glaréola pratincola* et la troisième mention du Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*.

À ces données, sont ajoutées toutes les données angevines homologuées par le CHN de 1981 à 1995.

### Modification des listes d'espèces à homologuer

À sa création le CHD 49 a constitué deux listes :

- une liste, dite départementale, d'espèces rares en Maine-et-Loire et donc à homologuer à chaque observation ;

- une liste, dite phénologique, d'espèces à homologuer lorsque les observations sortent des périodes habituelles de présence des espèces en Maine-et-Loire (FOSSÉ 1996).

Lors de sa réunion du 18 juin 1997, le CHD 49 a décidé de modifier les listes comme suit (cf. annexes I et II) :

#### • Liste départementale

L'**Eider à duvet** est supprimé de la liste départementale.

#### • Liste phénologique

Sont supprimées les espèces suivantes :

**Spatule blanche, Grande Aigrette, Bécasseaux minute et variable.**

Sont corrigées les dates suivantes :

**Outarde canepetière** homologable avant le 20 mars ;

**Martinet noir** avant le 1<sup>er</sup> avril ;

**Tarier des prés** après le 20 octobre ;

**Bécasseau maubèche** hors 20 mars-20 octobre (suppression zone intermédiaire) ;

**Bécasseau sanderling** hors 20 avril-30 novembre (*idem*) ;

**Tournepierrre à collier** hors 20 mars-10 octobre (*idem*).

### Présentation des données

Les données sont présentées dans l'ordre systématique, selon les deux listes (départementale puis phénologique). À la suite du nom, sont résumées, entre parenthèses, les données de 1968 à 1995 extraites du *bulletin du Groupe angevin d'études ornithologiques*, du *Crex* et de ce rapport :

- nombre de données/nombre d'individus examinés par le CHD 49 avant l'année en cours (y

compris les éventuelles données retardataires citées dans ce rapport) : plusieurs observations d'un même oiseau ou groupe d'oiseaux sur une période prolongée sont regroupées en une seule donnée ;

- nombre de données/nombre d'individus examinés par le CHD 49 pour l'année en cours : *idem* ;

- nombre d'années civiles : correspond au nombre d'années où l'espèce a été contactée durant ces 28 années ; il peut y avoir eu plusieurs contacts lors de saisons différentes (printemps et automne par exemple) ;

- nombre de séjours avec leur durée maximale : un séjour correspond au laps de temps durant lequel un oiseau ou un groupe d'oiseaux a pu être observé ;

- taille maximale des éventuels groupes (si présence d'au moins 2 individus et éventuellement nombre maximal d'oiseaux présents en même temps dans le département) ;

- dates extrêmes d'arrivée et de départ : si justifiées — l'absence de dates signifiant que l'espèce a été observée à n'importe quelle période de l'année.

Les nombres d'individus et de données obtenus depuis 1968 n'ont pu encore être comptabilisés (et ne le seront peut-être jamais) car il aurait fallu reprendre « à la main » tout le fichier des observations qui n'est pas informatisé...

Après le résumé, sont cités, dans l'ordre chronologique pour l'année étudiée, les communes avec les dates, nombres et caractéristiques des individus, lieux précis et observateurs.

Enfin, les données retardataires sont mentionnées par année.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris, 2 immatures le 20 août 1995 aux Ponts-de-Cé (G. Mourgaud *et al.* in FOSSÉ & CHD 49 1998).

## Liste systématique des données de 1992 à 1995 homologuées par le CHD 49

### 1. liste départementale

**Plongeon arctique *Gavia arctica*** (1/1, 0/0, 12 années/28, 23 séjours d'au maximum 27 jours, groupe maximal de 5 individus, date extrême d'arrivée : 22.10.93, date extrême de départ : 29.3.85)

**1994, Angers-Bouchemaine :** 19 décembre, 1 individu, lac de Maine (A. Fossé, fig. 1).

**Plongeon imbrin *Gavia immer*** (-/-, 1/1, 7 années/28, 10 séjours d'au maximum 110 jours, groupe maximal de 2 individus, date extrême d'arrivée : 14.11.95, date extrême de départ : 25.4.88)

**Brion-Longué-Jumelles :** 14 au 26 novembre, 1 juvénile, étang des Hayes (J.-P. Buron, E. Geslin, O. Loir et V. et O. Vimont).

**Grèbe jougris *Podiceps grisegena*** (1/1, 2/3, 14 années/28, 23 séjours d'au maximum 62 jours, groupe maximal de 2 individus)

**Denée - Mozé-sur-Louet :** 29 mars, 1 adulte, Prée de Serrant, (G. Mourgaud) ;

**Les Ponts-de-Cé :** 20 août, 2 immatures, Loire (G. Mourgaud *et al.*).

**1994, Angers-Bouchemaine :** 10 décembre au 29 janvier, 1 individu, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, J. Lainé et O. Loir).

**Crabier chevelu *Ardeola ralloides*** (1/1, 0/0, 3 années/28, 3 séjours d'au maximum 13 jours, date extrême d'arrivée : 13.5.94, date extrême de départ : 29.6.92)

**1994, Angers-Bouchemaine/Sainte-Gemmes-sur-Loire :** 13 au 25 mai, 1 individu, lac de Maine et prairies de la Baumette (A. Brodie).

**Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis*** (1/1, 1/1, 6 années/28, 7 séjours d'au maximum 44 jours, groupe maximal de 8 individus, date extrême d'arrivée : 5.4.84, date extrême de départ : 20.12.94)

**Cantenay-Épinard :** 8 mai, 1 individu (J.-P. Buron).




Fig. 1. — Plongeon arctique *Gavia arctica*, 19 décembre 1994, lac de Maine/Angers (A. Fossé).




Fig. 2. — Fuligule milouinan *Aythya marila*, 13 novembre 1994, étang de Maubusson/Saint-Michel-et-Chanveaux (Fr. Gabillard).

- 1994, Angers-Bouchemaine/Sainte-Gemmes-sur-Loire :** 7 novembre au 20 décembre, 1-2 immature(s), Le Fresne et lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, J. Lainé, O. Loir, Fr. Moreau et M. Vaslin).
- Nette rousse *Netta rufina*** (-/-, 1/1, 15 années/28, 22 séjours d'au maximum 70 jours, groupe maximal de 4 individus, date extrême d'arrivée : 29.8.93, date extrême de départ : 1.5.85)
- Saint-Georges-sur-Loire :** 10 au 13 janvier, 1 mâle, étang de Chevigné (M. Vaslin).
- Fuligule nyroca *Aythya nyroca*** (1/1, 0/0, 13 années/28, 16 séjours d'au maximum 46 jours, groupe maximal de 3 individus, date extrême d'arrivée : 4.10.82, date extrême de départ : 12.3.90)
- 1994, Angers-Bouchemaine :** 21 et 22 décembre, 1 mâle immature, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).
- Fuligule milouinan *Aythya marila*** (1/1, 1/2, 19 années/28, 38 séjours d'au maximum 120 jours, groupe maximal de 7 individus, date extrême d'arrivée : 22.9.83, date extrême de départ : 2.6.74, hormis 2 données des 10 et 13.7.88)
- Pouancé :** 14 janvier, 2 femelles/immatures, étang de Tressé (Fr. Gabillard et J.-M. Gillier).
- 1994, Saint-Michel-et-Chanveaux :** 13 novembre, 1 immature, étang de Maubusson (Fr. Gabillard, fig. 2); **Angers-Bouchemaine :** 21 décembre, 1 immature, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin et J. Lainé).
- Eider à duvet *Somateria mollissima*** (1/3, 1/1, 12 années/28, 14 séjours d'au maximum 139 jours, groupe maximal de 13 individus, date extrême d'arrivée : 17.9.88, date extrême de départ : 25.5.86)
- Angers-Bouchemaine :** 21 octobre au 8 novembre, 1 femelle, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, B. Buono et B. Moreau).
- 1994, Angers-Bouchemaine :** 6 décembre, 3 juvéniles, lac de Maine (J.-M. Blanchard et J. Landron).
- Macreuse noire *Melanitta nigra*** (-/-, 1/2, 14 années/28, 21 séjours d'au maximum 80 jours, groupe maximal de 7 individus, date extrême d'arrivée : 30.10.76, date extrême de départ : 25.4.80)
- Le Thoureil :** 24 décembre, 2 mâles adultes (J.-Fr. Cornuaille).
- Harle huppé *Mergus serrator*** (1/4, 3/5, 15 années/28, 18 séjours d'au maximum 110 jours, groupe maximal de 4 individus et jusqu'à 9 sur le département, date extrême d'arrivée : 4.11.88, date extrême de départ : 24.4.91)
- Parnay :** 20 avril, 3 femelles, Loire (V. Vimont); **Saint-Michel-et-Chanveaux :** 11 au 28 décembre, 1 femelle adulte, étang de Maubusson (Ph. Nourry); **Angers-Bouchemaine :** 19 décembre, 1 mâle, lac de Maine (Fr. Moreau).
- 1994, Angers-Bouchemaine :** 5 novembre, 4 femelles adultes, lac de Maine (B. Moreau).
- Faucon kobez *Falco vespertinus*** (-/-, 1/2, 3 années/28, 6 séjours d'au maximum 5 jours, groupe maximal de 2 individus, date extrême d'arrivée pré-nuptiale : 18.4.92, date extrême de départ pré-nuptiale : 16.6.68, date post-nuptiale : 1.11.84)
- Montreuil-Bellay :** 2 au 6 juin, 2 mâles immatures, Méron (A. Bajan, Y. Guenescheau, Th. Printemps, P. Raboin et Th. Roger).

**Glaréole à collier** *Gareola pratincola* (-/-, 1/1, 2 années/28, 2 séjours d'au maximum 3 jours, date postnuptiale : 11.9.88)  
**Montreuil-Juigné** : 21 au 23 mai, 1 adulte, marais (D. Pape et O. Loir, fig. 3 et 5).




Fig. 3. — Glaréole à collier *Gareola pratincola*, 21 mai 1995, marais de Montreuil-Juigné (O. Loir).

**Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrinus* (-/-, 1/1, 18 années/28, 39 séjours d'au maximum 32 jours, groupe maximal de 6 individus, date extrême d'arrivée : 29.3.92, date extrême de départ : 27.10.74)

**Les Jubeaux** : 9 avril, 1 femelle adulte (G. Carré et O. Loir).

**Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii* (1/1, 0/0, 15 années/28, 31 séjours d'au maximum 20 jours, groupe maximal de 4 individus, dates extrêmes pré-nuptiales : 21.3.61 et 22.5.84, dates extrêmes post-nuptiales : 18.8.73 et 20.11.74)

**1994, Pouancé** : 4 septembre, 1 individu, étang de Tressé (J.-M. Gillier).

**Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* (1/1, 0/0, 6 années/28, 6 séjours d'au maximum 20 jours, groupe maximal de 2 individus, dates extrêmes pré-nuptiales : 28.4.90 et 20.6.87, dates extrêmes post-nuptiales : 19.7.81 et 10.9.93)

**1992, Angers-Bouchemaine** : 17 août au 5 septembre, 1 juvénile, lac de Maine (A. Fossé, S. Hénaff et G. Mourgaud, fig. 4).




Fig. 4. — Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*, 18 août 1992, lac de Maine/Angers (A. Fossé).

**Hirondelle rousseline** *Hirundo daurica* (1/1, 0/0, 1 année/28, 1 séjour d'au maximum 1 jour)

**1993, Doué-la-Fontaine** : 18 avril, 1 individu (D. Le Déroff, 1<sup>re</sup> observation départementale).

**Bergeronnette printanière nordique** *Motacilla flava thunbergi* (-/-, 1/2, 11 années/28, 16 séjours d'au maximum 21 jours, groupe maximal de 10 individus, dates extrêmes pré-nuptiales : 9.4.83 et 13.5.85, dates extrêmes post-nuptiales : 24.8.73 et 12.9.88)

**La Bohalle** : 3 septembre, 2 individus (G. Mourgaud).

**Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* (-/-, 1/1, 8 années/28, 8 séjours d'au maximum 17 jours, dates extrêmes pré-nuptiales : 1.4.86, dates extrêmes post-nuptiales : 10.8.68 et 25.9.70)

**Soulaire-et-Bourg** : 5 septembre, 1 (femelle ?) immature (A. et C. Gentric).

**Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* (-/-, 1/1, connue chaque année dans le département de 1972 à 1984, disparition après l'hiver froid 1984-1985, observations isolées en 1988, 1991, 1993 et 1995)

**Tiercé** : 17 septembre au 25 octobre, 1 mâle juvénile, la Fardelière (A. et C. Gentric et M. Guillemain).

**Phragmite aquatique** *Acrocephalus paludicola* (1/1, 0/0, 3 années/28, 4 séjours d'au maximum 2 jours, date extrême d'arrivée : 17.8.72, date extrême de départ : 18.9.93)

**1993, Soulaire-et-Bourg** : 18 septembre, 1 juvénile, Noyant (A. Gentric).

**Rousserolle verderolle** *Acrocephalus palustris* (2/2, 0/0, 4 années/28, 7 séjours d'au maximum 12 jours, date extrême d'arrivée : 26.5.94, date extrême de départ : 9.7.88)

**1994, Soulaire-et-Bourg** : 26 mai, 1 chanteur (A. Gentric et O. Loir); **Châteauneuf-sur-Sarthe** : 30 mai au 8 juin, 1 chanteur, marais de la Grange (A. Gentric).

**Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* (1/2, 0/0, 14 années/28, 26 séjours d'au maximum 56 jours, groupe maximal de 6 individus, date extrême d'arrivée : 19.4.73, date extrême de départ : 20.8.83)

**1994, Tiercé** : 8 mai au 2 juillet, 1 couple, étang de Selène (A. et C. Gentric).

**Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)

**1993, Cholet** : 28 septembre, 1 individu, étang de la Godinière (J.-M. Logeais, 1<sup>re</sup> donnée départementale).

**Pouillot véloce nordique** *Phylloscopus collybita abietinus*

**Angers-Bouchemaine** : 8 et 10 décembre, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).

## 2. liste phénologique

**Grande Aigrette** *Egretta alba* (date extrême d'arrivée : 17.7.89, date extrême de départ : 28.4.91)

**Saint-Augustin-des-Bois** : 30 septembre, 1 individu, l'Hommelais (É. et Y. Braud) ;

**Saint-Laurent-du-Mottay** : 4 au 8 octobre,

- 1 individu, vallée de la Tau (O. Gabory).  
**Martinet noir** *Apus apus* (date extrême d'arrivée : 31.3.93, date extrême de départ : 14.10.91)  
 Longué : 19 septembre, 3 individus (P. Raboin et O. Vimont).  
**Martinet sp. *Apus sp.***  
 Beaupréau : 21 septembre, 3 individus (J. et M. Vaslin) ;  
 Les Ponts-de-Cé : 2 avril, 1 individu (J. Landron).  
**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus*  
 1994, Angers-Bouchemaine : 28 octobre, 1 individu (*acredula* ?), lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin).  
**Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* (date extrême d'arrivée : 21.4.95, date extrême de départ : 22.8.90)  
 Les Verchers-sur-Layon–Nueil-sur-Layon : 21 avril, 1 mâle adulte, Logis de Beauvais (J.-Fr. Cornuaille).  
**Pinson du nord** *Fringilla montifringilla* (date extrême d'arrivée : 6.10.95, date extrême de départ : 8.4.90)  
 Beaupréau : 6 octobre, 3 individus (M. Vaslin).

### Liste systématique des données de 1995 non homologuées par le CHD 49

#### 1. liste départementale

- Fuligule milouinan** *Aythya marila*  
 1995, Le Thoureil : 23 décembre, 1 individu.  
**Faucon kobez** *Falco vespertinus*  
 1995, Saint-Florent-le-Vieil : 6 mai, 1 individu.  
**Mésange boréale** *Parus montanus*  
 1993, Le Thoureil : 31 octobre, 3 individus.  
**Sizerin flammé** *Carduelis flammaea*  
 1995, Tiercé : 2 janvier, 1 individu.

#### 2. liste phénologique

- Faucon pèlerin** *Falco peregrinus*  
 1995, Le Fief-Sauvin–Le Puiset-Doré : 2 mai, 1 mâle adulte, forêt de Leppo.  
**Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur*  
 1995, Corné : 6 novembre, 1 individu.  
**Locustelle tachetée** *Locustella naevia*  
 1995, Soulaire-et-Bourg : 19 septembre, 2 individus.

### Liste systématique des données de 1995 non reçues par le CHD 49

À ce jour les observations suivantes — soumises à homologation — n'ont toujours pas été transmises au CHD 49 : elles ne seront pas homologuées si elles ne sont pas transmises avant le 31.12.98.

- Plongeon arctique** *Gavia arctica*, 2.1.95, Chevigné/Saint-Georges-sur-Loire ; 14 et 15.1.95, lac du Verdon.

- Grèbe jougris** *Podiceps grisegena*, 13.4 au 16.7.95, lac de Maine.  
**Grèbe esclavon** *Podiceps auritus*, 28.4.95, lac du Verdon.  
**Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis*, 22.3.95, Cantenay-Épinard ; 6.9.95, Chênehutte.  
**Grande Aigrette** *Egretta alba*, 1.10.95, Chevigné ; 8.10.95, vallée de la Tau.  
**Eider à duvet** *Somateria mollissima*, 17.12.95, lac de Maine ?  
**Macreuse noire** *Melanitta nigra*, 2.4.95, lac du Verdon.  
**Harle huppé** *Mergus serrator*, 20.3.95, lac de Ribou.  
**Caille des blés** *Coturnix coturnix*, 2 au 9.4.95, Louresse-Rochemenier.  
**Outarde canepetière** *Tetrax tetrax*, 31.3.95, Méron.  
**Sterne arctique** *Sterna paradisaea*, 2.11.95, étang de Beaufaire/Cléré-sur-Layon.  
**Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur*, 16.3.95, Varennes-sur-Loire.  
**Coucou geai** *Clamator glandarius*, 5.9.95, Saint-Florent-le-Vieil.  
**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava flava*, 4.11.95, lac de Maine.  
**Merle à plastron** *Turdus torquatus*, 10.3.95, Cholet.  
**Grive litorne** *Turdus pilaris*, 6.8.95, Louerre.  
**Grive mauvis** *Turdus iliacus*, 21.4.95, ?

### Liste systématique des données angevines de 1981 à 1995 homologuées par le CHN

Pour ce qui est des données examinées par le CHN, les premiers chiffres cités en début de parenthèses correspondent aux nombres de données/individus parus dans le *Bulletin du Groupe angevin d'études ornithologiques* et le *Crex*, respectivement pour les années antérieures à 1995 et pour 1995. Il apparaît ainsi que quelques données n'ont pas été soumises au CHN... Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Oie à bec court, 3 individus les 16 et 17 janvier 1987 à Louresse-Rochemenier (V. Leray in DUBOIS & CHN 1988). L'annexe III liste les espèces soumises à homologation nationale à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1998.

#### Grande Aigrette *Egretta alba*

- 1983, Pouancé : 16 au 23 décembre (D. Desmots et al. in DUBOIS & CHN 1986a).  
**Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* (2/4, 0/0, 2 années/28, 2 séjours d'au maximum 11 jours, groupe maximal de 3 individus, dates extrêmes : 16.1.87 et 8.4.71)  
 1987, Louresse-Rochemenier : 16 et 17 janvier, 3 individus (V. Leray in DUBOIS & CHN 1988).  
**Oie des neiges** *Anser caerulescens* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
 1985, Cantenay-Épinard : 21 janvier (E. Thyreau in DUBOIS & CHN 1986b).

- Tadome casarca** *Tadorna ferruginea* (3/3, 0/0, 3 années/28, 3 séjours d'au maximum 7 jours, dates extrêmes : 25.9.90 et 19.11.89)  
**1990, Montreuil-Juigné** : 25 septembre, 1 femelle (A. Fossé *in* DUBOIS & CHN 1990).
- Canard à front blanc** *Anas americana* (1/1, 0/0, 1 année/28, 1 séjour d'au maximum 39 jours, dates extrêmes : 2.10 au 9.11.85)  
**1985, Angers-Bouchemaine** : 2 octobre au 9 novembre, 1 mâle immature, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin *et al.* *in* DUBOIS & CHN 1986b).
- Sarcelle à ailes vertes** *Anas crecca carolinensis* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1982, La Tessoualle-Maulévrier** : 28 mars, 1 mâle, lac du Verdon (H. Martin — 1<sup>re</sup> mention française — *in* DUBOIS & CHN 1984a).
- Sarcelle à ailes bleues** *Anas discors* (0/0, 1/1, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1995, Saint-Georges-sur-Loire** : 11 avril, 1 mâle, étang de Chevigné (O. Loir *et al.* *in* DUBOIS & CHN 1997).
- Érismature rousse** *Oxyura jamaicensis* (3/4, 0/0, 3 années/28, 3 séjours d'au maximum 4 jours, groupe maximal de 2 individus, dates extrêmes : 15.11.86 et 23.11.83, y compris l'Érismature *sp.* ci-dessous)  
**1986, Saint-Georges-sur-Loire** : 15 novembre, 1 femelle/immature, étang de Chevigné (A. Fossé *in* DUBOIS & CHN 1987) ;  
**1989, Saint-Georges-sur-Loire** : 20 et 21 novembre, 1 femelle/immature, étang de Chevigné (Fr. Dupin *et al.* *in* DUBOIS & CHN 1995).
- Érismature *sp.*** *Oxyura sp.*  
**1983** : 22 et 23 novembre, 2 femelles/immatures, lac de Maine/Angers (J.-Cl. Beaudoin, É. Gauducheau et A. Gentric *in* DUBOIS & CHN 1990).
- Busard pâle** *Circus macrourus* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1993, Montreuil-Bellay** : 20 mars, 1 mâle (A. Bajan-Banaszak, Th. Printemps et Th. Roger *in* DUBOIS & CHN 1995).
- Marouette poussin** *Porzana parva* (2/3, 0/0, 2 années/28, 2 séjours d'au maximum 1 jour, groupe maximal de 2 individus, dates extrêmes : 29.8.79 et 25.10.81)  
**1981, Soucelles** : 25 octobre, 1 femelle/juvenile (J.-P. Le Mao *in* DUBOIS & CHN 1984a).
- Marouette de Baillon** *Porzana pusilla* (2/3, 0/0, 1 année/28, 1 séjour d'au maximum 18 jours, groupe maximal de 2 individus, dates extrêmes : 27.8 au 13.9.81)  
**1981, Angers** : 27 août au 1<sup>er</sup> septembre, 2 immatures (et non 1 comme cité par CHN), Tournemine (A. Fossé *in* DUBOIS & CHN 1984a) ;  
**Avrillé** : 13 septembre, 1 adulte (J.-P. Le Mao *in* DUBOIS & CHN 1984a).
- Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos* (2/2, 1/1, 3 années/28, 2 séjours d'au maximum 12 jours, dates extrêmes : 29.7.95 et 14.10.83)  
**1983, La Ménittré** : 14 octobre, Loire (Ph. Boisteault *in* DUBOIS & CHN 1984b) ;
- 1984, Angers-Bouchemaine** : 22 septembre au 3 (et non 4 comme cité par CHN) octobre, 1 juvénile, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin *et al.* *in* DUBOIS & CHN 1986a) ;
- 1995, La Ménittré** : 29 juillet, Loire (J.-P. Buron, M. Baillergeau et O. Loir *in* DUBOIS & CHN 1996).
- Bécasseau rousset** *Tryngites subruficollis* (2/2, 0/0, 2 années/28, 2 séjours d'au maximum 2 jours, dates extrêmes pré-nuptiales : 15 au 16.5.71, dates extrêmes post-nuptiales : 18.9.88)  
**1988, La Bohalle** : 18 septembre, 1 juvénile, Loire (J.-Cl. Beaudoin et J.-L. Jacquemin *in* DUBOIS & CHN 1989).
- Limnodrome à long bec** *Limnodromus scolopaceus* (2/2, 0/0, 2 années/28, 2 séjours d'au maximum 37 jours, dates extrêmes : 6.10.84 et 15.12.85)  
**1984, Angers-Bouchemaine** : 6 octobre au 11 novembre, 1 juvénile, lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, Ph. de Grissac, J.-P. Le Mao *et al.* *in* DUBOIS & CHN 1986a) ;
- 1985, Saumur** : 23 novembre au 15 (et non 8 comme cité par CHN) décembre, 1 juvénile, Loire (J.-Cl. Beaudoin, Y. Guenescheau *et al.* *in* DUBOIS & CHN 1987).
- Chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis* (4/5, 0/0, 4 années/28, 4 séjours d'au maximum 8 jours, groupe maximal de 2 individus, dates extrêmes : 6.4.68 et 23.5.91, sans compter les 4 du 8.9.91 et les 2 du 2.9.94 à La Bohalle, non homologués par CHD 49)  
**1984, Saint-Mathurin-sur-Loire** : 30 avril, Loire (J.-P. Le Mao *in* DUBOIS & CHN 1986a).
- Phalarope de Wilson** *Phalaropus tricolor* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1984, Saint-Mathurin-sur-Loire** : 2 novembre, Loire (J.-P. Le Mao *in* DUBOIS & CHN 1986a).
- Mergule nain** *Alle alle* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1991, Angers** : 11 au 13 janvier, 1 individu récupéré vivant le premier jour dans une zone industrielle d'Angers et mort le troisième au lac de Maine (J.-Cl. Beaudoin, J.-Cl. Dumas et A. Fossé *in* DUBOIS & CHN 1992).
- Bergeronnette printanière de Syke** *Motacilla flava beema* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1990, Sainte-Gemmes-sur-Loire** : 15 au 23 mai (J.-Cl. Beaudoin et A. Fossé *in* DUBOIS & CHN 1991).
- Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus fuscus* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1990, Corné** : 20 mai, 1 adulte capturé (A. Gentric *in* DUBOIS & CHN 1992).
- Pouillot véloce sibérien** *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens* (1/1, 0/0, 1 année/28, séjour ci-après)  
**1988, Andard** : 20 novembre, 1 individu capturé (M. Gys *in* DUBOIS & CHN 1996).

**Bruant nain** *Emberiza pusilla* (2/2, 0/0, 2 années/28, 2 séjours d'au maximum 1 jour, dates extrêmes : 22.10.88 et 28.12.91)  
 1988, Andard : 22 octobre, 1 individu capturé (J.-Cl. Beaudoin et M. Gys in DUBOIS & CHN 1989).

### Liste systématique des données angevines de 1981 à 1995 non homologuées par le CHN

#### Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*

1989, Le Puy-Saint-Bonnet : 9 novembre (DUBOIS & CHN 1991).

#### Buse féroce *Buteo rufinus*

1985, Challain-la-Potherie : 13 juillet (DUBOIS & CHN 1986b).

#### Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*

1994, Le Marillais : 3 septembre, 1 juvénile (DUBOIS & CHN 1996).

#### Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris*

1986, Cantenay-Épinard : 2 mars, 2 individus (DUBOIS & CHN 1987).

#### Bruant nain *Emberiza pusilla*

1990, Fontevraud : 6 mars (DUBOIS & CHN 1992).

### Remerciements

Nous tenons à remercier Jean-Yves FRÉMONT, secrétaire du CHN, qui a bien voulu prendre le temps de nous faire parvenir quelques fiches anciennes et la dernière liste nationale d'homologation. □

### Bibliographie

DUBOIS Ph., Comité d'homologation national, 1984a. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1981 et 1982. *Alauda*, 52 (2) : 102-125.

- 1984b. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1983. *Alauda*, 52 (4) : 285-305.
  - 1986a. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1984. *Alauda*, 54 (1) : 25-48.
  - 1986b. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1985. *Alauda*, 54 (4) : 286-307.
  - 1987. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1986. *Alauda*, 55 (4) : 325-355.
  - 1988. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1987. *Alauda*, 56 (4) : 293-322.
  - 1989. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1988. *Alauda*, 57 (4) : 263-294.
  - 1990. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1989. *Alauda*, 58 (4) : 245-266.
  - 1991. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1990. *Alauda*, 59 (4) : 225-247.
  - 1992. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1991. *Alauda*, 60 (4) : 199-221.
  - 1993. — Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1992. *Alauda*, 61 (4) : 231-256.
  - 1995. — Les oiseaux rares en France en 1993. *Ornithos*, 2 (1) : 1-19.
  - 1996. — Les oiseaux rares en France en 1995. *Ornithos*, 3 (4) : 153-175.
  - 1997. — Les oiseaux rares en France en 1996. *Ornithos*, 4 (4) : 141-164.
- FOSSÉ A, 1996. — Comité d'homologation départemental. *Crex*, 1 : 47-52.
- Archives et bulletins du Groupe angevin d'études ornithologiques et de la LPO Anjou, *LPO Infos Anjou*. □




Fig. 5. — Glaréole à collier *Galreola pratincola*, 21 mai 1995, marais de Montreuil-Juigné (O. Loir).

## Annexe I.

## Liste des espèces soumises à homologation en Maine-et-Loire

Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	**Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	*Pingouin torda	<i>Alca torda</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Mergule nain	<i>Alle alle</i>
*Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>	*Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
*Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>
*Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
*Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	*Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
*Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	*Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
*Puffin de Méditerranée	<i>Puffinus yelkouan</i>	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
*Océanite tempête	<i>Hydrobatas pelagicus</i>	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
*Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotellus</i>	*Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	**Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	*Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>
Héron gardebœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	*Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Oie des moissons (taïga)	<i>Anser f. fabalis</i>	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>
Oie des moissons (toundra)	<i>Anser f. rossicus</i>	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	*Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Tadorna casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	*Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	*Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Fuligule milouinain	<i>Aythya marila</i>	*Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Harelede boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i>
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	*Lusciniôle à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
*Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
*Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	*Hypolaïs ictérine	<i>Hippolaïs icterina</i>
*Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	**Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
*Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	**Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	**Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	*Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	Panure à moustaches	<i>Parus biarmicus</i>
Gr. à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	*Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
*Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Chevalier stagnatille	<i>Tringa stagnatilis</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	*Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	*Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>
Grand Labbe	<i>Catharacta skua</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	*Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Mouette de Sabine	<i>Larus sabini</i>	*Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammula</i>
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
		et *Bernache cravant à ventre pâle	<i>Branta bernicla hrota</i>
		Bergeronnette printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
		Pouillot véloce nordique	<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>
		*Pie-grièche (grise) méridionale	<i>Lanius (excubitor) meridionalis</i>
		Corneille mantelée	<i>Corvus corone cornix</i>
		et exotiques non pris en charge par CHN (Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiacus</i> ...)

## Légende

1 : contact visuel, 2 : hors Saumurois, 3 : hors Fontevraud,

\* : aucun contact en M.-et-L., \*\* : contact(s) antérieur(s) à 1960



## Annexe II.

## Présence des espèces non sédentaires en Maine-et-Loire

	du	au +	du	au		du	au +	du	au
Plongeon catmarin	30.10	15.4			Coucou gris	1.3	30.9		
Grèbe à cou noir	15.7	15.5			Engoulevant d'Europe	15.4	30.9		
Blongios nain	20.4	22.9			Martinet noir	1.4	15.9		
Bihoreau gris	10.3	15.11			Huppe fasciée	5.3	30.9		
Héron pourpré	20.3	30.9			Torcol fourmilier	1.4	30.9		
Cigogne noire	1.3	15.10			Hirondelle de rivage	5.3	25.10		
Bernache cravant	1.10	31.3			Hirondelle de cheminée	6.3	5.11		
Canard siffleur	25.8	27.4			Hirondelle de fenêtre	10.3	7.11		
Sarcelle d'été	20.2	15.10			Pipit rousseline	15.4	30.9		
Bondrée apivore	20.4	7.10			Pipit des arbres	20.3	15.10		
Milan noir	25.2	15.9			Pipit spioncelle	25.9	16.4		
Circète Jean-le-Blanc	20.3	(15.9)			Bergeronnette printanière	20.3	31.10		
Busard cendré	1.4	20.9			Bergeronnette flavéole	25.3	25.9		
Faucon émerillon	1.10	30.4			Bergeronnette de Yarrell	20.9	10.4		
Faucon hobereau	1.4	31.10			Rosignol philomèle	1.4	8.9		
Faucon pèlerin	1.9	30.4			Rougequeue à front blanc	15.3	20.10		
Caille des blés	24.4	(15.9)			Tarier des prés	15.3	20.10		
Râle des genêts	1.4	(30.9)			Traquet moiteux	5.3	15.11		
(Marouette ponctuée	8.3	20.9)			Merle à plastron	20.3	2.5		
Outarde canepetière	20.3	(25.10)			Grive litorne	5.10	30.4		
Petit Gravelot	10.3	10.11			Grive mauvis	1.10	15.4		
Grand Gravelot	20.2	10.11			Locustelle tachetée	25.3	15.8		
Pluvier doré	15.7	20.5			Phragmite des joncs	1.4	20.9		
Bécasseau maubèche	20.3	20.10			Rousserolle effarvate	14.4	1.10		
Bécasseau sanderling	20.4	30.11			Hypolaïs polyglotte	20.4	14.9		
Bécasseau cocorli	1.5	20.10			Fauvette grisette	28.3	25.9		
Bécassine sourde	20.9	10.5			Fauvette des jardins	25.3	16.9		
Barge rousse	20.3	20.5 +	10.7	30.10	Pouillot de Bonelli	25.3	25.8		
Barge à queue noire	15.1	30.10			Pouillot siffleur	10.4	16.9		
Courlis corlieu	20.3	20.9			Pouillot fitis	10.3	10.10		
Chevalier arlequin	20.2	10.12			Gobemouche gris	8.4	10.10		
Chevalier aboyeur	20.3	10.12			Gobemouche noir	15.4	20.5 +	12.8	6.10
Chevalier sylvain	10.3	20.10			Tichodrome échelette	15.10	31.3		
Tournepieuvre à collier	20.3	10.10			Loriot d'Europe	15.4	5.9		
Sterne pierregarin	7.3	24.10			Pie-grièche écorcheur	15.4	31.8		
Sterne naine	10.4	4.10			(Pie-grièche grise	1.10	31.3)		
Guifette moustac	5.4	30.6			(Pie-grièche à tête rousse	24.4	10.8)		
Guifette noire	7.4	26.10			Pinson du Nord	10.10	10.4		
Tourterelle des bois	5.4	5.11			Tarin des aulnes	3.10	15.4		

Les dates entre parenthèses concernent des espèces pour lesquelles très peu de données ont été recueillies en Maine-et-Loire.

**Annexe III.**  
**Liste des espèces soumises à homologation en France**

**Liste n° 1 : espèces occasionnelles au niveau national (catégories A, B et C)**

<b>Plongeon à bec blanc</b>	<i>Gavia adamsii</i>	<b>Guillemot à miroir</b>	<i>Cephus grylle</i>
<b>Albatros à sourcils noirs</b>	<i>Diomedea melanophrys</i>	<b>Syrhapte paradoxal</b>	<i>Syrhaptus paradoxus</i>
<b>Albatros hurleur</b>	<i>Diomedea exulans</i>	<b>Tourterelle orientale</b>	<i>Streptopelia orientalis</i>
<b>Pétrel de Bulwer</b>	<i>Bulweria bulwerii</i>	<b>Harfang des neiges</b>	<i>Nyctea scandiaca</i>
<b>Puffin semblable</b>	<i>Puffinus assimilis</i>	<b>Chouette épervière</b>	<i>Surnia ulula</i>
<b>Océanite de Wilson</b>	<i>Oceanites oceanicus</i>	<b>Engoulevent à collier roux</b>	<i>Caprimulgus ruficollis</i>
<b>Océanite de Castro</b>	<i>Oceanodroma castro</i>	<b>Guépier de Perse</b>	<i>Merops superciliosus</i>
<b>Cormoran pygmée</b>	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	<b>Sirli de Dupont</b>	<i>Chersophilus duponti</i>
<b>Frégate superbe</b>	<i>Fregata magnificens</i>	<b>Alouette pispolette</b>	<i>Calandrella rufescens</i>
<b>Aigrette des récifs</b>	<i>Egretta gularis</i>	<b>Pipit de Richard</b>	<i>Anthus richardi</i>
<b>Héron mélanocéphale</b>	<i>Ardea melanocephala</i>	<b>Pipit à dos olive</b>	<i>Anthus hodgsoni</i>
<b>Oie à bec court</b>	<i>Anser brachyrhynchus</i>	<b>Pipit de la Petchora</b>	<i>Anthus gustavi</i>
<b>Oie naine</b>	<i>Anser erythropus</i>	<b>Bergeronnette citrine</b>	<i>Motacilla citreola</i>
<b>Bernache à cou roux</b>	<i>Branta ruficollis</i>	<b>Agrobate roux</b>	<i>Cercotrichas galactotes</i>
<b>Sarcelle élégante</b>	<i>Anas formosa</i>	<b>Rosignol progné</b>	<i>Luscinia luscinia</i>
<b>Sarcelle marbrée</b>	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	<b>Robin à flancs roux</b>	<i>Tarsiger cyanurus</i>
<b>Eider à tête grise</b>	<i>Somateria spectabilis</i>	<b>Traquet isabelle</b>	<i>Oenanthe isabellinus</i>
<b>Érismature rousse</b>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<b>Traquet pie</b>	<i>Oenanthe pleschanka</i>
<b>Érismature à tête blanche</b>	<i>Oxyura leucocephala</i>	<b>Traquet du désert</b>	<i>Oenanthe deserti</i>
<b>Élanion blanc</b>	<i>Elanus caeruleus</i>	<b>Traquet rieur</b>	<i>Oenanthe leucura</i>
<b>Vautour moine</b>	<i>Aegyptius monachus</i>	<b>Grive dorée</b>	<i>Zoothera dauma</i>
<b>Busard pâle</b>	<i>Circus macrourus</i>	<b>Grive de Sibérie</b>	<i>Zoothera sibirica</i>
<b>Buse féroce</b>	<i>Buteo rufinus</i>	<b>Grive obscure</b>	<i>Turdus obscurus</i>
<b>Buse pattue</b>	<i>Buteo lagopus</i>	<b>Grive de Naumann</b>	<i>Turdus n. naumanni</i>
<b>Aigle pomarin</b>	<i>Aquila pomarina</i>	<b>Grive à ailes rouges</b>	<i>Turdus (naumanni) eunomus</i>
<b>Aigle criard</b>	<i>Aquila clanga</i>	<b>Grive à gorge rousse</b>	<i>Turdus r. ruficollis</i>
<b>Aigle des steppes</b>	<i>Aquila rapax</i>	<b>Grive à gorge noire</b>	<i>Turdus (ruficollis) atrogularis</i>
<b>Aigle impérial</b>	<i>Aquila heliaca</i>	<b>Locustelle de Pallas</b>	<i>Locustella certhiola</i>
<b>Aigle ibérique</b>	<i>Aquila (heliaca) adalberti</i>	<b>Locustelle lancéolée</b>	<i>Locustella lanceolata</i>
<b>Faucon crécerellette</b>	<i>Falco naumanni</i>	<b>Locustelle fluviatile</b>	<i>Locustella fluviatilis</i>
<b>Faucon d'Éléonore</b>	<i>Falco eleonora</i>	<b>Locustelle fasciée</b>	<i>Locustella fasciolata</i>
<b>Faucon lanier</b>	<i>Falco biarmicus</i>	<b>Rousserolle isabelle</b>	<i>Acrocephalus agricola</i>
<b>Faucon sacré</b>	<i>Falco cherrug</i>	<b>Rousserolle des buissons</b>	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
<b>Faucon gerfaut</b>	<i>Falco rusticolus</i>	<b>Hypolaïs pâle</b>	<i>Hippolaïs pallida</i>
<b>Marouette poussin</b>	<i>Porzana parva</i>	<b>Hypolaïs bottée</b>	<i>Hippolaïs caligata</i>
<b>Marouette de Baillon</b>	<i>Porzana pusilla</i>	<b>Fauvette sarde</b>	<i>Sylvia sarda</i>
<b>Talève d'Allen</b>	<i>Porphyrio alleni</i>	<b>Fauvette de Rüppell</b>	<i>Sylvia rueppelli</i>
<b>Talève sultane</b>	<i>Porphyrio porphyrio</i>	<b>Fauvette naine</b>	<i>Sylvia nana</i>
<b>Foulque caronculée</b>	<i>Fulica cristata</i>	<b>Fauvette épervière</b>	<i>Sylvia nisoria</i>
<b>Outarde houbara</b>	<i>Chlamydotis undulata</i>	<b>Pouillot verdâtre</b>	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
<b>Grande Outarde</b>	<i>Otis tarda</i>	<b>Pouillot boréal</b>	<i>Phylloscopus borealis</i>
<b>Courvite isabelle</b>	<i>Cursorius cursor</i>	<b>Pouillot de Pallas</b>	<i>Phylloscopus proregulus</i>
<b>Glaréole à ailes noires</b>	<i>Glaréola nordmanni</i>	<b>Pouillot à grands sourcils</b>	<i>Phylloscopus inornatus</i>
<b>Gravelot de Leschenault</b>	<i>Charadrius leschenaultii</i>	<b>Pouillot de Hume</b>	<i>Phylloscopus (inornatus) humei</i>
<b>Pluvier asiatique</b>	<i>Charadrius asiaticus</i>	<b>Pouillot de Schwarz</b>	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
<b>Pluvier fauve</b>	<i>Pluvialis fulva</i>	<b>Pouillot brun</b>	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
<b>Vanneau sociable</b>	<i>Chettusia gregaria</i>	<b>Gobemouche nain</b>	<i>Ficedula parva</i>
<b>Vanneau à queue blanche</b>	<i>Chettusia leucura</i>	<b>Pie-grièche isabelle</b>	<i>Lanius isabellinus</i>
<b>Bécasseau à cou roux</b>	<i>Callidris ruficollis</i>	<b>Pie-grièche masquée</b>	<i>Lanius nubicus</i>
<b>Bécasseau à queue pointue</b>	<i>Callidris acuminata</i>	<b>Choucas de Daourie</b>	<i>Corvus dauuricus</i>
<b>Bécasseau falcinelle</b>	<i>Limicola falcinellus</i>	<b>Étourneau unicolore</b>	<i>Sturnus unicolor</i>
<b>Bécassine double</b>	<i>Gallinago media</i>	<b>Étourneau roselin</b>	<i>Sturnus roseus</i>
<b>Courlis à bec grêle</b>	<i>Numenius tenuirostris</i>	<b>Moineau espagnol</b>	<i>Passer hispaniolensis</i>
<b>Chevalier bargette</b>	<i>Tringa cinerea</i>	<b>Sizerin blanchâtre</b>	<i>Carduelis hornemanni</i>
<b>Labbe à longue queue</b>	<i>Stercorarius longicaudus</i>	<b>Bec-croisé bifascié</b>	<i>Loxia leucoptera</i>
<b>Goéland rائلleur</b>	<i>Larus genei</i>	<b>Bec-croisé perroquet</b>	<i>Loxia pytyopsittacus</i>
<b>Goéland d'Audouin</b>	<i>Larus audouinii</i>	<b>Roselin githagine</b>	<i>Rhodopechys githaginea</i>
<b>Goéland à ailes blanches</b>	<i>Larus glaucooides</i>	<b>Roselin cramoiisi</b>	<i>Carpodacus erythrinus</i>
<b>Mouette de Ross</b>	<i>Rhodostethia rosea</i>	<b>Durbec des sapins</b>	<i>Pinicola enucleator</i>
<b>Mouette blanche</b>	<i>Pagophila eburnea</i>	<b>Bruant à calotte blanche</b>	<i>Emberiza leucocephala</i>
<b>Sterne voyageuse</b>	<i>Sterna bengalensis</i>	<b>Bruant cendrillard</b>	<i>Emberiza caesia</i>
<b>Sterne élégante</b>	<i>Sterna elegans</i>	<b>Bruant rustique</b>	<i>Emberiza rustica</i>
<b>Sterne bridée</b>	<i>Sterna anaethetus</i>	<b>Bruant nain</b>	<i>Emberiza pusilla</i>
<b>Sterne fuligineuse</b>	<i>Sterna fuscata</i>	<b>Bruant auréole</b>	<i>Emberiza aureola</i>
<b>Guillemot de Brünnich</b>	<i>Uria lomvia</i>	<b>Bruant mélanocéphale</b>	<i>Emberiza melanocephala</i>

plus toutes les espèces exclusivement nord-américaines  
toutes les espèces plus rares que celles mentionnées ci-dessus  
Tous les genres n'appartenant pas à la faune nicheuse européenne  
Certaines sous-espèces, par exemple :

<b>Bernache du Pacifique</b>	<i>Branta bernicla nigricans</i>
<b>Sarcelle à ailes vertes</b>	<i>Anas crecca carolinensis</i>
<b>Macreuse à bec jaune</b>	<i>Melanitta nigra americana</i>
<b>Buse des steppes</b>	<i>Buteo buteo vulpinus</i>

<b>Bergeronnette printanière</b>	<i>Motacilla flava feldegg</i>
<b>Tarier pâtre oriental</b>	<i>Saxicola torquata Maura/stejnegeri</i>
<b>Pouillot véloce sibérien</b>	<i>Phylloscopus collybita tristis/fulvescens</i>
	etc.

**Liste n° 2 : espèces occasionnelles d'origine douteuse (catégorie D1)**

<b>Pélican blanc</b>	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	<b>Oie des neiges</b>	<i>Anser caeruleus</i>
<b>Pélican frisé</b>	<i>Pelecanus crispus</i>	<b>Grue demoiselle</b>	<i>Anthropoides virgo</i>
<b>Pélican gris</b>	<i>Pelecanus rufescens</i>	<b>Bruant à tête rousse</b>	<i>Emberiza bruniceps</i>
<b>Spatule d'Afrique</b>	<i>Platalea alba</i>		etc.

**Liste n° 3 : espèces occasionnelles sans catégorie, mais dont il faut garder une trace**

<b>Flamant nain</b>	<i>Phoenicopterus minor</i>	<b>Moineau doré</b>	<i>Passer luteus</i>
<b>Sterne inca</b>	<i>Larosterna inca</i>		etc.
<b>Bulbul des jardins</b>	<i>Pycnonotus barbatus</i>		

Légende : 1 : sauf Méditerranée, 2 : sauf Corse, 3 : sauf Albères